口腔粘膜病学（一）

A_1型题

1. 疱疹性龈口炎的病因是 A.细菌 B.病毒 C.真菌 D.衣原体 E.立克次体
2. 引起口腔单纯疱疹的主要致病菌为 A.金黄色葡萄球菌B.单纯疱疹病毒 C.变形链球菌D.柯萨奇病毒A_4E.白色念珠菌
3. 单纯疱疹病毒侵犯人体的部位不包括 A.口腔 B.皮肤 C.角膜 D.中枢神经系统 E.消化道
4. 疱疹性龈口炎多见于 A.6 个月～3 岁婴幼儿 B.学龄前儿童 C.青少年 D.中年人 E.老年人
5. 带状疱疹的病原菌是 A.柯萨奇病毒 B.单纯疱疹病毒 C.腺病毒 D.水痘－带状疱疹病毒 E.肠道病毒
6. 引起带状疱疹的诱因不包括 A.上呼吸道感染 B.外伤 C.免疫功能低下者 D.患恶性肿瘤 E 患遗传性疾病
7. 关于带状疱疹，最主要最具诊断意义的临床表现是 . A.发病多见于春秋季节 B.发病前可有发烧、全身不适、食欲减退等前驱症状 C.一般不留瘢痕，可留一时性的色素沉着斑 D.疱疹沿神经单侧分布，不越过中线 E.病毒可侵犯面神经，造成面瘫，耳聋等症状
8. 球菌性口炎的致病菌不包括 A.卡他球菌 B.肺炎双球菌 C.溶血性链球菌 D.金黄色葡萄球菌 E.变形链球菌
9. 关于球菌性口炎的临床特征下列那项是错误的？A.球菌性口炎临床多为继发感染，原发感染少见 B.急性病程，多伴头痛、咽痛等全身不适 C.口腔粘膜及牙龈发红、糜烂，表面形成丝缎状灰白色伪膜 D.涂片或培养可见大量球菌 E.多见于青壮年，主要特征为口腔粘膜出现绿豆大小的散在的溃疡
10. 坏疽性口炎的发病原因可能是 A.口腔卫生不良 B.维生素缺乏 C.局部创伤 D.病毒感染 E.细菌感染
11. 坏疽性口炎的临床特征为 A.牙龈红肿，牙齿松动和牙周袋溢脓 B.牙龈粘膜有汇集成簇的水泡 C.牙龈粘膜剥脱、红肿 D.附着龈苍白水肿、可有坏死及出血 E.牙龈乳头呈刀削状缺损，疼痛出血，有特异口臭
12. 口腔结核病损最常见的形式为 A.结核初疮 B.结核性溃疡 C.寻常狼疮 D.结核性骨髓炎 E.结核性根尖周炎
13. 口腔结核的病原微生物是 A.细菌 B.病毒 C.支原体 D.真菌 E.原虫
14. 口腔念珠菌病致病菌中最主要，毒力最强的念珠菌为 A.高里念珠菌 B.假热带念珠菌 C.近平滑念珠菌 D.热带念珠菌 E.白色念珠菌
15. 口腔念珠菌病常发生于以下情况，除了 A.长期使用广谱抗生素 B.长期使用免疫抑制剂 C.患有慢性消耗性疾病 D.长期精神紧张 E.白色念珠菌本身毒力增强
16. 那一类人群患口腔念珠菌病 A.患有胃肠道疾病 B.有烟酒嗜好 C.更年期妇女 D.长期使用抗生素者 E.青壮年

17. 激素类的口腔制剂不能用于那种口腔粘膜病的治疗 A.复发性口腔溃疡 B.扁平苔藓 C.多形红斑 D.类天疱疮 E.口腔念珠菌病
18. 口腔念珠菌病临床最常出现的症状为 A.口干 B.阵发痛 C.粗糙感 D.麻木不适 E 冷热痛
19. 确定慢性增殖性念珠菌病有无异常增生的最有价值的诊断技术为 . A.涂片镜检 B.唾液培养 C 血 CEA 测定.D 活体组织检查.E 血清铁含量测定及念珠菌抗体的检测
20. 临床怀疑口腔念珠菌感染时，首先选用的辅助诊断技术为 . A.唾液培养B.唾液及血清念珠菌抗体测定C.血清铁及维生素B_{12}测定D.直接涂片镜检E.活体组织检查
21. 最易引起口腔粘膜及皮肤发生过敏反应的药物是 A.四环素 B.增效联磺片 C.氯喹 D.阿西平 E.0.05%洗必太液
22. 药物过敏性口炎的发生与以下因素有关，除了 A.药物本身直接致敏 B.药物降解产物或代谢产物 C.服用药物的数量 D.病人的个体素质 E.药物在体内蓄积作用
23. 药物过敏性口炎选用激素的方法为 A.强地松，每日 30mg，1～2 周 B.强地松，每日 60mg，3～4 周 C.强地松，每日 10mg，1～2 个月 D.强地松开始每日 60mg，逐渐减至 10～15mg/d，疗程半年 E.强地松 30～40mg/d，3～4 个月
24. 药物引起口腔粘膜产生变态反应炎症的途径为 A.口服 B.含漱或湿敷 C.涂擦 D.注射 E.以上都是
25. 血管神经性水肿发病诱因，与下列那项因素无关？A.某些药物或食物 B.外伤 C.精神因素 D.肠道寄生虫 E.病毒感染
26. 血管神经性水肿一般不发生在 A.唇 B.舌 C.上腭 D.眼睑 E.咽喉部
27. 血管神经性水肿严重的并发症为 A.眼球穿孔 B.气胸 C.食道狭窄 D.肺炎 E.喉头水肿、窒息
28. 多形渗出性红斑属 A.感染性疾病 B.传染性疾病 C.变态反应疾病 D.遗传性疾病 E.自身免疫性疾病
29. 鉴别多形渗出性红斑与药物过敏性口炎最重要的是两者 A.发病急缓不同 B.治疗方法不同 C.预后不同 D.致病诱因不同 E.组织病理表现不同
30. 下列那项描述不符合多形红斑的临床特征？A.发病有季节性，春秋季多见 B.发病过程缓慢，常迁延不愈，无自限性 C.病损特征为红斑、水肿、大疱、糜烂等 D.口腔、皮肤、眼、生殖器均可出现病损 E.可伴有不同程度的全身反应
31. 多形渗出性红斑口腔粘膜病变特点为 A.粘膜表面出现溃疡 B.红斑、水疱 C.粘膜出现针头大小的透亮水疱 D.粘膜出现致密的白色伪膜 E.粘膜表现为白色条纹
32. 口腔变态反应性疾病，不包括 A.血管神经性水肿 B.接触性口炎 C.药物性口炎 D 斯展综合症.E Riga 病
33. 多形渗出性红斑也称为 . A.大疱性表皮松解症 B 巨型麻疹.C 斯展综合症.D 普及综合症.E 腐败性口炎
34. 复发性口腔溃疡的确切病因是 . A.细菌感染 B.病毒感染 C.遗传因素 D.营养障碍 E.尚不清楚

35. 下列那项不是复发性口腔溃疡的临床特征 A.好发于中青年 B.反复发作的溃疡为圆形或椭圆形，表面有黄色伪膜，周围红晕 C.多见于唇、颊、舌等非角化粘膜 D.病变可影响到口周皮肤 E.病程 7～14 天，有自限性
36. 复发性口腔溃疡治疗措施中那项效果最佳？A.口腔局部消炎、止痛、促愈合 B.手术切除 C.注射转移因子或口服左旋咪唑 D.尽可能找出与发病有关的全身和局部因素，加以治疗 E.补充营养
37. 以下那条不是疱疹样口疮与疱疹性口炎的鉴别要点？A.两者病因不同 B.两者病损表现形式不同 C.两者分布部位不同 D.两者病程不同 E.是否影响皮肤
38. 复发性口腔溃疡的病程一般为 A.2～3 天 B.7～14 天 C.1 个月 D.数个月 E.长期不愈
39. 复发性口腔溃疡很少见于 A.唇 B.颊 C.舌尖、舌腹、舌缘 D.牙龈、硬腭 E.软腭、悬雍垂
40. 口腔粘膜创伤性损害的原因可以是 A.机械刺激 B.微生物感染 C.理化刺激 D.过敏反应 E.精神因素
41. 下列那项病损表现不可能为机械行刺激所致？A.糜烂、溃疡 B.炎性增生 C.充血水肿 D.白色角化 E.组织坏死
42. 坏死性龈口炎的致病菌为 A.梭形杆菌和疏螺旋体 B.放线菌 C.链球菌和螺旋体 D.梭形杆菌和密螺旋体 E.丝状菌
43. 坏死性龈口炎在临床上易与下列疾病相混淆，除了 A.膜性口炎 B.白血病 C.粒细胞减少症 D.急性疱疹性龈口炎 E.口腔结核
44. 口腔念珠菌病根据临床表现可分为 A.伪膜型、红斑型、增殖型 B.伪膜型、溃疡型、增殖型 C.充血型、萎缩型、增生型 D.充血型、溃疡型、萎缩型 E.萎缩型、坏死型、伪膜型
45. 口腔念珠菌病最常出现的临床症状为 A.口干、烧灼感、刺激痛 B.口苦、麻木感 C.涩感、粗糙感 D.搔痒感 E.异物感
46. 急性疱疹性龈口炎多发生于 A.舌腹、口底粘膜 B.唇、颊粘膜 C.牙龈、硬腭粘膜 D 口底、软腭粘膜 E.唇、舌粘膜
47. 单纯疱疹除可在口腔粘膜发病外，尚可在以下那些部位出现病损，除了 A.生殖器 B.口周皮肤 C.结膜，角膜 D.呼吸道粘膜 E.躯干、四肢皮肤
48. 发生在软腭后部及咽喉部的急性伪膜型念珠菌病应与以下那种疾病鉴别？A.膜性口炎 B.疱疹性咽峡炎 C.传染性单核细胞增多症 D.急性疱疹性龈口炎 E.白喉
49. 复发性口腔溃疡在临床上可分为以下几型？A.轻型、口炎型、巨型和白塞病 B.轻型、疱疹型和重型 C.轻型、疱疹型和坏死型 D.普通型、特殊型 E.充血型、溃疡型、坏死型
50. 口腔念珠菌病口腔局部治疗宜选用那种含漱剂？A.弱碱性液体 B.弱酸性液体 C.含抗生素液体 D.含激素液体 E.含止痛药物的液体
51. 水痘－带状疱疹病毒属 A.RNA 病毒 B.DNA 病毒 C.EB 病毒 D.巨细胞病毒 E.肠道病毒
52. 球菌性口炎局部治疗首选的漱口水是 A.0.05％洗必太液 B.0.25％金霉素液 C.0.1％利凡诺液 D.3％双氧水 E.0.05％高锰酸钾液

53. 急性坏死性龈口炎首选的漱口水是 A.0.05％洗必太液 B.0.25％金霉素液 C.0.1％利凡诺液 D.3％双氧水或 0.05％高锰酸钾液 E.1％～2％普鲁卡因液
54. 球菌性口炎又称为 A.鹅口疮 B.膜性口炎 C.急性坏死性龈口炎 D.疱疹性口炎 E.口炎型口疮
55. 口腔念珠菌病病损区涂片直接镜检可见 A.菌丝和孢子 B.梭状杆菌和螺旋体 C.病毒水疱和包涵体 D.大量细菌及白细胞 E.分枝杆菌
56. 膜性口炎病原菌是A.I型单纯疱疹病毒B.梭螺杆菌C.金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌D.分枝杆菌E.柯萨奇病毒A_4
57. 急性疱疹性龈口炎的临床特征为 A.口腔粘膜反复出现散在的圆形或椭圆形溃疡 B.牙龈、上腭等口腔粘膜出现簇集的针头大小的透明水疱 C.口腔粘膜出现白色凝乳状的斑点或斑块，不易擦掉 D.皮肤及口腔粘膜出现疱疹并沿神经排列，不超过中线 E.口腔粘膜，手掌，足底出现水泡、丘疹等病损
58. 带状疱疹的临床特征为 A.口腔粘膜反复出现散在的圆形或椭圆形溃疡 B.牙龈、上腭等的口腔粘膜出现簇集的针头大小的透明水疱 C.口腔粘膜出现白色凝乳状的斑点或斑块，不易擦掉 D.皮肤及口腔粘膜出现丛集成簇的疱疹并沿神经排列，不超过中线 E.口腔粘膜、手掌、足底出现水疱、丘疹等病损
59. 带状疱疹的局部用药为 A.5％无环鸟苷软膏 B.口腔溃疡膏 C.鱼石脂软膏 D.克霉唑软膏 E.达克宁霜
60. 坏疽性口炎的首选药物 A.制霉菌素 B.交沙霉素加甲硝唑 C.皮质激素 D.青霉素 E.三氮唑核苷
61. 创伤性溃疡的临床特征为 A.溃疡形态不规则，边缘隆起，溃疡形态与刺激物相吻合 B.溃疡深大，呈菜花状，基底及边缘硬，有浸润，疼痛不明显 C.溃疡边缘不规整，基底有桑葚状小结节，疼痛明显 D.溃疡深大，边缘隆起，呈弹坑状，表面有灰黄色伪膜，基底软 E.溃疡表浅，为圆形或椭圆形，表面有灰黄色伪膜，周围红晕
62. 白色念珠菌的致病形式为 A.芽生孢子 B.厚膜孢子 C 假菌丝.D 真菌丝.E 酵母样菌
63. 慢性增殖型念珠菌病的临床特征为 A.口腔粘膜可见边界清楚的红斑，舌乳头萎缩伴口角粘膜糜烂、皲裂 B.口腔粘膜出现白色丘疹、网纹，基底粘膜充血 C.舌背中央后部粘膜出现菱形的丝状乳头萎缩区 D.口腔粘膜上出现白色凝乳状斑点或斑膜，无明显自觉症状 E.口角内侧粘膜表面出现致密白色斑块，表面粗糙，伴双侧口角发红及皲裂形成.
64. 药物过敏性口炎的临床特征为 A.皮肤红斑、水疱，口腔大小不等的水疱 B.皮肤水疱或斑丘疹，口腔为相互融合的透明小水疱 C.皮肤结节性红斑，口腔为反复发作的溃疡 D.皮肤紫色丘疹，口腔为白色条纹 E.皮肤大疱，口腔粘膜白色斑痕
65. 血管神经性水肿又称 A.固定药疹 B.巨型巡麻疹 C.斯展综合症 D.接触性口炎 E.托牙性口炎
66. 多形渗出性红斑典型皮损为 A.面、四肢对称性靶形红斑 B.面部突出部蝶形红斑 C.四肢紫色扁平丘疹 D.手掌、足底、臀部皮肤丘疹、斑疹和水疱 E.下肢结节性红斑

67. 斯展综合症的临床特征为 A.口腔大面积充血、水肿、渗出、糜烂，伴鼻腔、生殖器、肛门、眼损害 B.双侧口角湿白、糜烂、皲裂，伴皮肤、生殖器和眼病变 C.口腔、生殖器溃疡，针刺反应阳性，眼反复发生结膜炎、角膜炎等 D.口腔反复溃疡，伴结肠溃疡 E.口腔粘膜特别是下唇出现雀斑样色素沉着，伴胃肠道息肉
68. 化学性损伤可导致口腔粘膜出现 A.溃疡、水肿、增生 B.糜烂、溃疡、坏死膜形成 C.充血、水肿、溃疡、继发白色念珠菌感染 D.大疱、溃疡 E.肉芽肿形成
69. 淋病的口腔表现特征 A.硬下疳 B.充血、水肿、糜烂、溃疡 C.白色斑块 D.大疱 E.肉芽肿形成
70. 淋病的病原菌是 A.溶血型链球菌 B.梭形杆菌 C 金黄色葡萄球菌.D 淋病双球菌.E 螺旋体
71. 唇疱疹的发病诱因不包括 A.阳光照射 B.机械损伤 C.感冒 D.情绪变化 E.长期服用抗生素
72. 单纯疱疹在临床上易与下列疾病相混淆，除了 A.口炎性口疮 B.带状疱疹 C.类天疱疮 D.手足口病 E.疱疹性咽颊炎
73. 单纯疱疹病毒可经下列途径传播，除了 A.呼吸道 B.皮肤 C.角膜 D.粘膜 E.消化道
74. 带状疱疹的诱因不包括 A.患恶性肿瘤 B.患艾滋病 C.大面积烧伤 D.阳光照射 E.长期大量使用类固醇激素
75. 下列疾病愈后可留有瘢痕的是 A.扁平苔藓 B.天疱疮 C.带状疱疹 D.腺周口疮 E.粘膜血疱
76. 下列药物具有抗病毒作用的是 A.转移因子 B.类固醇激素 C.阿糖腺苷 D.泰而登 E.阿司匹林
77. 非口腔结核诊断所必须的辅助检查是 A.结核菌素试验 B.X 线片或胸透 C.红细胞沉降率 D.涂片抗酸染色 E.血氧饱和度测定.
78. 口腔结核性溃疡在临床上应与下列疾病相鉴别，除了 A.创伤性溃疡 B.癌性溃疡 C.梅毒 D.多形红斑 E.深部真菌感染
79. 有关多形渗出性红斑下列那项描述是错误的 A.口腔粘膜表现为大面积糜烂 B.皮肤损害为红斑、水疱 C.眼部病损为虹膜睫状体炎和前房积脓 D.是一种变态反应性疾病 E.可伴有明显的全身反应
80. 复发性口腔溃疡的发病因素不包括 A.遗传因素 B.免疫功能异常 C.超氧化物歧化酶活性降低 D.真菌感染 E.消化功能异常
81. 淋病的治疗首选 A.甲硝唑 B.庆大霉素 C.青霉素或先锋霉素 D.氟康唑 E.左旋咪唑
82. 下列疾病可造成舌乳头萎缩，除了 A.扁平苔藓 B.地图舌 C.盘状红斑狼疮 D.口腔念珠菌感染 E.B 族维生素缺乏
83. 白念涂片镜检，滴加 10％氢氧化钠的作用为 A.溶解孢子 B.溶解角质 C.消毒灭菌 D.固定 E.染色
84. 白塞病属于 A.自身免疫病 B.感染性疾病 C.传染性疾病 D.变态反应性疾病 E.遗传性疾病
85. 有关淋病的描述下列那项是错误的 A.为一种急性或慢性传染病 B.女性较男性容易感染 C.主要通过性交传染 D.诊断主要依赖活体组织检查 E.临床表现为尿道炎、膀胱炎

86. 诊断血管神经性水肿时，应注意与那种疾病鉴别 A.慢性唇炎 B.肉芽肿性唇炎 C.腺性唇炎 D.盘状红斑狼疮 E.唇疱疹

87. 天疱疮属于

A.过敏性疾病
B.自身免疫病
C.免疫缺陷病
D.感染性疾病
E.传染性疾病

88. 下列疾病中那个属于自身免疫病

A.白色念珠菌病
B.多形性红斑
C. 天疱疮
D.艾滋病
E.单纯疱疹

89. 下列疾病属于自身免疫病，除了 A. 天疱疮 B. 类天疱疮 C.白塞病 D.红斑狼疮 E.多形红斑

90. 天疱疮属于 A.口腔粘膜大疱类疾病 B.口腔粘膜溃疡性疾病 C.口腔粘膜感染性疾病 D.口腔粘膜斑纹类疾病 E.变态反应性疾病

91. 上皮细胞间失去了连接、属于自身免疫的疾病是 A.类天疱疮 B. 多形性红斑 C. 红斑狼疮 D. 天疱疮 E. 白塞病

92. 天疱疮的病理特点是出现 A.上皮下庖 B.基底细胞液化变性 C.上皮角栓 D.结缔组织炎症细胞浸润 E.上皮内庖

93. Tzanck 细胞又名 A.颗粒细胞 B.胶样小体 C.角化细胞 D. 天疱疮细胞 E.诊断细胞

94. 天疱疮的治疗特点是 A.必须使用激素控制 B.必须用抗生素控制 C.不必用激素控制 D.不必用抗生素控制 E.以中医中药治疗为主

95. 天疱疮的激素治疗特点是 A.急上急下 B.口腔局部含化即奏效 C.分为起始、控制、维持等阶段 D.可以被中药代替 E.停药后病情不复发

96. 应用激素可能造成以下情况，除了 A.糖尿病 B.消化道溃疡 C.念珠菌感染 D.血钙降低 E.血压降低

97. 天疱疮的病情得以控制后，激素可逐渐减量，每次递减的剂量宜为 A.20mgB.15mgC.10mgD.5mgE.1mg

98. 下面那个疾病存在抗基底膜抗体 A. 天疱疮 B. 白塞病 C. 红斑狼疮 D.类天疱疮 E.扁平苔藓

99. 良性粘膜类天疱疮又称为 A.红斑性类天疱疮 B.瘢痕性类天疱疮 C.增生性类天疱疮 D.落叶性类天疱疮 E.大疱性类天疱疮

100. 类天疱疮属于 A.先天性免疫缺陷病 B.获得性免疫缺陷病 C.自身免疫性疾病 D.变态反应性疾病 E.免疫复合物沉着病

101. 以下与类天疱疮有关的事实是正确的，除了 A.可用直接免疫荧光检查 B.有自身循环抗体 C.有抗基底膜抗体 D 抗基底膜区抗体主要是 IgG.E.有抗细胞间抗体

102. 类天疱疮可出现以下临床表现，除了 A.皮肤水疱 B.睑球结合膜粘连 C.剥脱性龈炎 D.尼氏征阳性 E.小口畸形

103. 类天疱疮治疗是以 A.增强免疫为主 B.调节免疫为主 C.抑制免疫为主 D.支持疗法为主 E.局部用药为主

104. 关于类天疱疮的治疗下列那项说法是错误的 A.可用强地松口服 B.局部抗炎、止痛 C.防止眼结膜纤维性粘连 D.中医中药治疗 E.避免日光照射

105. 关于白斑的发病因素下列那项说法是正确的？A.咀嚼槟榔可导致白斑 B.菌斑刺激可导致白斑 C.戒烟可导致白斑 D.白斑有家族遗传倾向 E.免疫低下可造成白斑

106. 关于白斑的发病因素下列那项说法是错误的？A.吸烟者更易患白斑 B.高血压患者更易患白斑 C.梅毒患者更易患白斑 D.男性白斑患者多见 E.由于机械摩擦因素引起的白色角化病损不属于白斑

107. 关于白斑的临床分型下列那项说法是错误的 A.分为均质型和非均质型 B. 非均质型又分为疣状型、颗粒型、溃疡型 C. 均质型表现为均质斑块和表面有皱褶 D.疣状型属于非均质型 E. 非均质型包括疣状型、颗粒型、萎缩型

108. 关于白斑的临床表现下列那项说法是错误的 A.颗粒型白斑发生在发红的粘膜上 B.白斑有时伴白色念珠菌感染 C.口底舌腹的白斑常为皱褶状 D.疣状白斑不恶变 E.颗粒型白斑有可能恶变

109. 关于疣状白斑下列那个说法是错误的 A.表面有毛刺状突起 B.常有粗糙感 C.与烟酒刺激无关 D.可伴溃疡形成 E.白色斑块高出粘膜面

110. 关于颗粒型白斑下列说法肯定正确的 A.属于均质型白斑 B.属于非均质型白斑 C.一般不伴溃疡 D.甲苯胺蓝染色阴性 E.很少伴白色念珠菌病感染

111. 关于白斑的临床表现下列那项说法是错误的 A.病损有对称性 B.斑块白色或灰白色 C.可发生在口腔粘膜任何部位 D.损害大小不一 E.损害大小与恶变之间无平行关系

112. 下列各项可用于鉴别白色水肿与白斑，除了 A.白色水肿质地柔软 B.白色水肿边界不清 C.白色水肿表面光滑 D.白色水肿无上皮角化 E.白色水肿棘层细胞肿胀

113. 白斑的诊断 A.必须有病理检查证实 B.可根据血液化验 C.可根据家族病史确认 D.可根据临床检查作出 E.必须由直接免疫荧光检查作出

114. 下列那项不是白色海绵状斑痣的特点 A.家族性遗传疾病 B.口干 C.损害皱襞状、海绵状 D.口腔、眼结膜、外阴都可发生 E.无痛

115. 以下那项措施不宜用于白斑治疗 A.口服维生素 A B.硝酸银烧灼 C.戒烟 D.手术切除 E.涂鱼肝油

116. 下列措施治疗白斑可能有效，除了 A.激光照射 B.冷冻 C.手术切除 D.戒除烟酒 E.雾化吸入

117. 下列那项与扁平苔藓发病无关？A.使用药物 B.精神情绪因素 C.创伤因素 D.免疫异常 E.遗传因素

118. 下列那项不是扁平苔藓口腔表现 A.糜烂 B.水疱 C.丘疹 D.斑块 E.皲裂

119. 下列那项不是扁平苔藓的发病部位 A.头皮 B.生殖器 C.指甲 D.眼结膜 E.口腔粘膜

120. 下列那项不是扁平苔藓的发病特点 A.女性多发 B.中年多发 C.皮损有 Wickham 纹 D.口腔病损不具有对称性 E.口腔病损多部位发生

121. 对扁平苔藓做出诊断时，应参考以下因素，除了 A.眼结膜充血 B.组织病理检查结果 C.皮损有 Wickham 纹 D.免疫病理检查结果 E.口腔病损有对称性

122. 以下那项不是扁平苔藓的病理表现 A.上皮不全角化 B.基底细胞液化变性 C.粘膜固有层淋巴细胞带状浸润 D.出现胶样小体 E.胶原纤维变性

123. 对扁平苔藓进行治疗应参考以下因素，除了 A.有无胶样小体出现 B.病损的临床分型 C.有无皮损 D.有无临床症状 E.有恶变可能

124. 下列疾病中属于自身免疫疾病的是 A.药疹 B. 多形性红斑 C.慢性盘状红斑狼疮 D.艾滋病 E. 单纯疱疹

125. 下列因素中与慢性盘状红斑狼疮发病关系密切的是 A.地理环境 B.病灶牙的存在 C.月经不调 D.日光 E.冷热刺激

126. 下列因素中与慢性盘状红斑狼疮发病关系最为密切的是 A.内分泌疾病 B.消化道疾病 C.心血管疾病 D.冷热刺激 E.日光照射

127. 下列因素中与慢性盘状红斑狼疮发病关系最为密切的是 A.遗传因素 B.消化道疾病 C.心血管疾病 D.月经不调 E.地理环境

128. 下列因素中与慢性盘状红斑狼疮发病关系不密切的是 A.药物变态反应 B.精神焦虑 C.慢性感染 D.冷热刺激 E.日光照射

129. 慢性盘状红斑狼疮在口腔粘膜的好发部位是 A.颊部粘膜 B.舌背粘膜 C.下唇唇红 D.上唇唇红 E.上腭粘膜

130. 慢性盘状红斑狼疮在皮肤的好发部位是 A.前胸 B.腰背 C.四肢 D.躯干 E.头面部

131. 慢性盘状红斑狼疮在皮肤的典型表现是 A.多形红斑 B.蝶形红斑 C.靶形红斑 D.疱形红斑 E.萎缩性红斑

132. 治疗慢性盘状红斑狼疮发病可选用A.呋咪呱啶酮B.氯化喹啉C.维甲酸D.氟康唑E.维生素B_2

133. 以下药物中具有避光作用的是 A.二氧化钛霜 B.肤轻松 C.维甲酸 D.克霉唑 E.金霉素眼膏

134. 以下那项不是氯化喹啉的副作用 A.恶心、呕吐 B.白细胞数降低 C.视力损害 D.血压降低 E.肝功能损害

135. 慢性唇炎的病因是 A.舔唇不良习惯 B.创伤 C.感冒所致 D.消化不良 E.残根残冠刺激

136. 慢性唇炎的病因可能是下列因素，除了 A.空气干燥 B.风吹日晒 C.营养缺乏 D.摄水不足 E.变态反应

137. 慢性唇炎的临床表现是下列诸项，除了 A.放射状斑纹 B.皲裂 C.脱屑 D.结痂 E.唇肿胀

138. 最有可能伴面神经麻痹的唇炎是 A.光化性唇炎 B.肉芽肿性唇炎 C.腺性唇炎 D.良性淋巴增生性唇炎 E.脱屑性唇炎

139. 急性光化性唇炎是以 A.脱屑为主 B.肿胀为主 C.淋巴增生为主 D.糜烂为主 E.皲裂为主

140. 应用活检有助于诊断的疾病是 A.光化性唇炎和肉芽肿性唇炎 B.肉芽肿性唇炎和脱屑性唇炎 C.腺性唇炎和肉芽肿性唇炎 D.良性淋巴增生性唇炎和脱屑性唇炎 E.脱屑性唇炎和光化性唇炎

141. 下列因素可引起口角炎，除了 A.营养不良 B.细菌刺激 C.霉菌感染 D.口角潮湿 E.寒冷刺激

142. 下列各项为口角炎常见的临床表现，除了 A.皮肤、粘膜充血 B.粘膜丘疹 C.口角湿白 D.口角皲裂 E.口角糜烂

143. 维生素 B 缺乏除有口角炎之外，还表现为 A.鼻炎、唇炎 B.鼻炎、咽炎 C.鼻炎、舌炎 D.舌炎、唇炎 E.咽炎、唇炎

144. 以下那项不是口角炎的临床表现 A.张口过度 B.口角疼痛 C.张口受限 D.口角结痂 E.口角皮肤皲裂

145. 以下各项可作为维生素 B 族缺乏口角炎的诊断依据，除了 A.菌状乳头肿大充血 B.丝状乳头萎缩 C.轮廓乳头肿大 D.口角糜烂 E.唇干燥、脱屑、微肿

146. 以下各项可作为口角炎的诊断依据，除了 A.口角肿物 B.张口受限 C.口角疼痛 D.口角糜烂、结痂 E.口角处细菌培养阳性

147. 以下各项可能是地图舌的病因，除了 A.舔舌的不良习惯 B.消化不良 C.肠寄生虫 D.病灶感染 E.遗传因素

148. 以下各项可能是地图舌的病因，除了 A.病灶感染 B.胃肠功能紊乱 C.肠寄生虫 D.口腔 Ph 值改变 E.精神情绪因素

149. 地图舌又称为 A.贫血性舌炎 B.消化不良性舌炎 C.游走性舌炎 D.腹泻性舌炎 E.霉菌性舌炎

150. 地图舌又称为 A.充血性舌炎 B.硬化性舌炎 C.霉菌性舌炎 D.腹泻性舌炎 E.剥脱性舌炎

151. 下列那项与地图舌无关 A.游走性舌炎 B.硬化性舌炎 C.消化不良 D.病灶感染 E.剥脱性舌炎

152. 游走性舌炎的病损常为 A.菱形 B.盘形 C.蝶形 D.地图形 E.长形

153. 下列各项为地图舌的临床表现，除了 A.丝状乳头片状剥脱 B.舌背形成红色光滑区 C.红色区可糜烂 D.剥脱区微凹陷 E.菌状乳头清晰可见

154. 地图舌的病损边缘表现为 A.丝状乳头片状剥脱 B.红色光滑区 C.糜烂 D.凹陷 E.高起

155. 地图舌的病损经常变换位置，是因为 A.剥脱区不断扩大 B.舌不断活动 C.细菌的作用 D.唾液 Ph 值的变化 E.某种牙膏的作用

156. 与地图舌难鉴别的疾病是 A.贫血性舌炎 B.舌萎缩型扁平苔藓 C.舌天疱疮 D.菱形舌 E.毛舌

157. 地图舌患者可能有的症状是 A.自发痛 B.口干 C.冷热痛 D.烧灼，刺激痛 E.阵发性疼痛

158. 关于地图舌的地图样病损不对的说法是 A.剥脱区不断扩大 B.圆形或椭圆形剥脱病损融合形成地图状 C.丝状乳头片状剥脱 D.剥脱区凹陷 E.病损位置固定不变

159. 关于地图舌正确的说法是 A.舌活动受限 B. 圆形或椭圆形剥脱病损融合形成地图状 C.患者有自发痛 D.剥脱区微突起 E.发病与口内 Ph 值有关

160. 常与沟纹舌并存的疾病是 A.复发性口腔溃疡 B.白色念珠菌病 C.贫血性舌炎 D.叶状乳头炎 E.游走性舌炎
161. 沟纹舌往往 A.影响舌活动度 B.影响舌味觉 C.有舌粘膜颜色改变 D.沟内积存食物、细菌 E.有舌乳头改变
162. 下列那项与沟纹舌和肉芽肿性唇炎组成梅罗综合征 A.面神经麻痹 B.三叉神经痛 C.地图舌 D.皮脂腺异位 E.菱形舌
163. 下列那项与沟纹舌和面神经麻痹组成梅罗综合症 A.血管神经性水肿 B.腺性唇炎 C.肉芽肿性唇炎 D.皮脂腺异位 E.毛舌
164. 沟纹舌患者应 A.清除牙菌斑 B.清理沟内食物残屑 C.去除残根残冠 D.切除沟纹 E.服药治疗
165. 以下那项不是舌体上分布的乳头 A.切牙乳头 B.轮廓乳头 C.叶状乳头 D.丝状乳头 E.菌状乳头
166. 以下那项可能是丝状乳头萎缩的原因 A.贫血 B.舔舌习惯 C.维生素 B 缺乏 D.真菌感染 E.地图舌
167. 梅毒是 A.代谢疾病 B.内分泌疾病 C.过敏性疾病 D.免疫缺陷病 E.传染性疾病
168. 梅毒的病原体是 A.细菌 B.病毒 C.真菌 D.螺旋体 E.寄生虫
169. 梅毒的病原体易存活于 A.有氧环境 B.干燥环境 C.体外环境 D.厌氧环境 E.有菌环境
170. 梅毒的病原体易存活于 A.有氧环境 B.潮湿环境 C.有菌环境 D.体外环境 E.干燥环境
171. 以下那项不是梅毒的临床分型？A.三期梅毒 B.先天梅毒 C.梅毒下疳 D.一期梅毒 E.二期梅毒
172. 梅毒下疳发生在 A.感染后第 1 周 B.感染后第 2 周 C.感染后第 3 周 D.感染后第 4 周 E.感染后第 5 周
173. 关于梅毒下疳错误的说法是 A.无痛 B.圆形或椭圆形单个溃疡 C.覆棕黄色薄痂 D.触及如硬币或软膏样 E.病损内不含病原体
174. 梅毒下疳可于什么时候自行愈合 A.感染后第 3～8 周 B. 感染后第 4～9 周 C. 感染后第 5～10 周 D. 感染后第 6～10 周 E. 感染后第 7～10 周
175. 梅毒粘膜斑表现为 A.灰白色光亮斑块 B.白色角化斑块 C.红色斑块 D.棕色斑块 E.黄色斑块
176. 二期梅毒可有以下症状，除了 A.肝脾肿大 B.全身淋巴结肿大 C.组织穿孔 D.头痛 E.低热
177. 梅毒橡胶肿是 A.结缔组织 B.淋巴组织 C.血管组织 D.间叶组织 E.肉芽组织
178. 三期梅毒可出现以下表现，除了 A.粘膜白斑 B.梅毒疹 C.中枢神经系统损害 D.橡胶肿 E.组织穿孔
179. 死胎或早产出现在 A.梅毒一期 B.梅毒二期 C.早期先天梅毒 D.晚期先天梅毒 E.梅毒三期
180. 晚期先天梅毒患者 A.无感染力 B.有感染力 C.无抵抗力 D.有抵抗力 E.无病原体
181. 治疗梅毒首选 A.红霉素 B.氯霉素 C.金霉素 D.青霉素 E.链霉素

182. 艾滋病的病原体是 A.巨细胞病毒 B.EB 病毒 C.人类乳头状瘤病毒 D.人类免疫缺陷病毒 E.单纯疱疹病毒

183. 关于艾滋病的下列说法错误的是A.病的全称是获得性免疫缺陷综合征B.病毒主要攻击T_8细胞C.发生条件性感染和肿瘤D.人类免疫缺陷病毒是病原体E.病毒离开人体不易生存

184. 以下是艾滋病的传播方式，除了 A.性接触传播 B.母婴垂直传播 C.静脉吸毒传播 D.输血传播 E.口腔飞沫传播

185. 以下是艾滋病的预防措施，除了 A.避免性关系紊乱 B.终止患艾滋病母亲的妊娠 C.严格筛查供血人员和血液制品 D.加强高危人群的监测 E.避免与艾滋病病人的日常接触

186. 毛状白斑发生在 A.舌背 B.舌尖 C.舌缘 D.舌根 E.口底

187. 以下是艾滋病患者口腔常有的表现，除了 A.扁平苔藓 B.带状疱疹 C.急性坏死性龈口炎 D.卡波西肉瘤 E.毛状白斑

188 下列那项不是毛状白斑的临床表现？A.多为双侧发生 B.主要在舌缘、舌腹 C.表面有毛状突起 D.可以擦掉 E.一般无自觉症状

A_2型题

205 男性，40 岁，感冒后，下唇及唇周皮肤出现成簇的针头大小的小水疱，破溃后结痂，局部灼痒疼痛。可能患有的疾病为 A.口角炎 B.固定性药疹 C.复发性口疮 D 口蹄疫.E.唇疱疹

206 女性，28 岁，发烧 2 天后，感上腭左侧牙龈刺痒，灼痛。不久发现左侧上腭牙龈红肿，表面出现成簇小米粒大小的透明水疱，破溃后成小溃疡。下列治疗措施中，最主要的是 A.肌注青霉素 B.口服解热镇痛药 C.卧床休息补充多种维生素 D.口服无环鸟苷或板蓝根冲剂 E.保持口腔清洁

207.男性，38 岁。全身不适，食欲减退 2 天，伴上唇左侧唇红粘膜及周围皮肤起疱、结痂来诊。在考虑诊断时下列那种疾病最不可能？A.疱疹性口炎 B.唇疱疹 C.带状疱疹 D.疱疹性咽峡炎 E.慢性唇炎

208 患者，男性，20 岁。因吸毒感染艾滋病，HIV（＋）。检查发现下前牙牙龈缘及颊部粘膜表面有溃疡形成，表面覆灰白色污秽假膜，牙龈乳头消失，口臭明显。应诊断为 A.快速进展型牙周炎 B.坏疽性口炎 C.白血病 D.剥脱性龈炎 E.粒细胞减少症

209.女婴，2 个月，口腔粘膜出现白色凝乳状斑点及斑块可擦拭，基底粘膜发红，啼哭，哺乳困难，应怀疑为 A.鹅口疮 B.复发性口腔溃疡 C.疱疹性龈口炎 D.球菌性口炎 E.克隆病

210.男性，60 岁，患糖尿病 10 年。近 2 周来口干、口渴加重，双侧口角裂口、出血，近期有明显烧灼感。检查双侧口角伴有皲裂形成，上下颌为全口义齿修复，义齿承托区粘膜发红，其范围与义齿相吻合。义齿表面涂片镜检可见大量菌丝。临床治疗应选那种方法最有效？A.每日用 3%~5%碳酸氢钠液含漱B.保持口腔卫生,注意餐具的隔离消毒C.改换或重衬义齿D.口含制霉菌素或达克宁霜局部涂擦E.补充铁/维生素B_{12}及叶酸

211.女性,46 岁,口腔溃疡反复发作 3 年,间隔 1~2 个月,多在经前出现,每次 1~3 个不等,主要位于下唇和舌等部位,疼痛明显,7~10

天左右愈合.要想达到理想的治疗效果,宜采取 A.口腔局部对症治疗 B.全身使用抗生素 C.补充多种维生素 D.口服雌激素+口腔局部对症治疗 E.注射转移因子

212 男性,60 岁,鼻咽癌术后放疗,放疗两次后口腔粘膜大面积溃烂,疼痛明显.该患者可能的诊断为 A.白色念珠菌感染 B.放射性口腔炎 C.急性感染性口炎 D.过敏性口炎 E.接触性口炎

213.男性,68 岁,口腔溃烂 3 个月来诊,体检发现双颊粘膜大面积溃烂,有边缘扩展现象,糜烂面表面被覆较厚的灰白色伪膜,呈斑片状.经脱落细胞学检查拟诊为天疱疮.查血常规及分类白细胞 1.6×10^9/L，中性 82%。本病例最切合实际的首选治疗为A.1%～2%普鲁卡因液含漱止痛B.局部应用皮质类固醇激素类软膏C.全身给予抗生素，口腔局部用 0.25%金霉素含漱液D.口含制霉菌素，口腔局部用碱性漱口水E.保持口腔卫生，去除刺激因素

214.男性，8 岁，因牙龈及口腔粘膜坏死溃烂 1 周，伴高烧 10 天来诊。经检查初步诊断为坏死性龈口炎。口腔局部治疗时，以下那种药物不适用 A.3%过氧化氢 B.1%龙胆紫 C.10%硝酸银 D.牙周塞制剂 E.养阴生肌散或冰硼散

215.女性，22 岁，因全口牙龈肿痛，伴自发性出血来诊，检查患者口腔卫生差，牙石软垢III度，口臭明显。全口牙龈红肿 21|12 唇侧牙龈乳头呈刀削状，表面有灰白色伪膜被覆，去除坏死膜，基底为易出血的新鲜创面。该病例拟诊断为A.急性感染性口炎B.放射性口腔炎C.坏死性龈口炎D.疱疹性龈口炎E.白血病

216.男性，36 岁，口内多处溃疡，疼痛不能进食来诊。检查双颊及舌粘膜，可见小米粒的溃疡十余个散在分布，周围粘膜广泛充血红肿。以往曾有多次类似发作病史。该患者诊断为 A.疱疹性咽峡炎 B.疱疹性龈口炎 C.白塞病 D.带状疱疹 E.疱疹样口疮

217.男性，24 岁，口腔溃疡反复发作 5 年，加重半年。查：舌缘左右侧各见两块约 1.0～1.2cm 大小的溃疡，边缘不整，表面有灰白色的膜。下唇内侧粘膜有条形白色斑痕。该患者拟诊断为“腺周口疮”，临床应注意与下列那种疾病相鉴别？A.多形红斑 B.扁平苔藓 C.褥疮性溃疡 D.单纯疱疹 E.白血病

218.女性，65 岁，上下颌全口义齿修复，近 2 周感下颌舌侧粘膜疼痛，不能带义齿来诊。查下颌舌侧与口底粘膜移形处可见一条形增生组织，边缘外翻，表面有少许伪膜，疼痛明显。此患者拟诊断为A.Riga病B.Bednar口疮C.增殖性病损D.粘膜血庖E.癌性溃疡

219.患儿，男性，8 个月，舌系带溃烂 1 月，查下颌 I | I 萌出，边缘锐利，舌系带处可见 1.0×0.8cm 大小的溃疡，溃疡增殖，边缘高起外翻，表面有灰白色伪膜，触较硬。此患儿可能诊断为 A.Riga 病 B.Bednar 口疮 C.腺周口疮 D.褥疮性溃疡 E.鹅口疮

220.女性，24 岁，因左侧上颌后牙牙髓炎在外院行塑化治疗，治疗后相对应的左颊粘膜破溃，疼痛明显来诊，该患者临床印象为化学性灼伤，最有效地治疗措施为 A.局部涂 2.2%碘甘油 B.0.1

%利凡诺含漱，局部涂抗菌药膜或药膏 C.用大量的 0.9%生理盐水或清水冲洗 D.观察，不用药 E.口服抗生素
221.男性，45 岁，因头颈部肿物放疗，放疗结束后感口干、进食刺激痛来诊。查：口腔粘膜干，唾液粘稠，双颊、上下唇内侧粘膜可见弥散不规则红斑，舌背丝状乳头广泛萎缩，粘膜充血发红明显。其诊断首先应考虑为A.放射性口炎B.继发白念感染C.口干综合症D.维生素B_2缺乏E.糜烂型扁平苔藓
222.女性，39 岁，因口腔粘膜反复起庖 9 个多月就诊，起庖和进食无关，疱损可破溃形成溃疡。临床检查可见上下牙唇颊侧牙龈粘膜有多个水疱或糜烂面，探针无法探入疱损周围粘膜下，左侧舌腭弓粘膜有瘢痕挛缩，患者不曾用过任何抗免疫治疗。关于该疱损的说法下列那项可能是错误的？A.应取活检确诊 B.直接免疫荧光检查有助于诊断 C.还应检查皮肤和眼结膜 D.水疱位于上皮下 E.水疱位于上皮内
223.男性，40 岁，发现右颊粘膜白色斑块 1 个月，临床检查除右颊孤立白色斑块外未发现其他病损。你认为下列那项提供的信息不足以作为本病例的发病因素？A.吸烟习惯 B.病损局部机械刺激因素 C.白色念珠菌感染 D.唾液 Ph 值偏高 E.嗜酒习惯
224.女性患者，46 岁，1 年来口腔粘膜反复起庖，破溃，此起彼伏，伴有疼痛。检查发现：口腔粘膜广泛云雾状水肿，有多处鲜红糜烂面，周围有灰白色疱膜，撕取疱膜时可同时揭去周围正常粘膜。脱落细胞涂片可见 Tzanck 细胞。治疗本病开始时应给以 A.强的松 100～200mg/dB. 强的松 60～80mg/dC. 强的松 40～60mg/dD. 强的松 30mg/dE. 强的松 10mg/d
225.女性，52 岁，左上后牙牙龈反复起庖，探针不能探入疱周粘膜下。可发现抗基底膜区抗体的方法是A.直接免疫荧光检查B.间接免疫荧光检查C.组织病理学检查D.脱落细胞培养E.血清免疫球蛋白测定

A_3型题

A_3与A_4型题
226～229 题共用题干
患儿，女性，2.5 岁。以高烧 3 天，口腔溃疡 2 天，啼哭，流涎，拒食来诊。体检发现患儿全口牙龈红肿，上腭及舌背粘膜可见汇集成簇的针头大小透明水疱，部分已破溃为浅表溃疡，周围粘膜充血红肿广泛。
226.本病例最可能的诊断为 A.鹅口疮 B.手足口病 C.疱疹性龈口炎 D.口炎型口疮 E.急性坏死性龈口炎
227.本病例感染的病原体可能为A.金黄色葡萄球菌B.柯萨奇病毒A_{16}C.I型单纯疱疹病毒D.肺炎链球菌E.白色念珠菌
228.根据本病例的临床表现，首选的辅助检查措施为 A.病损区涂片检查 B.活检 C.血常规及分类检查 D.T 细胞亚群测定 E.肝肾功能
229.本病例的治疗措施中那一项不适宜？A.注意休息加强营养B.全身应用抗病毒药物C.局部应用类固醇激素雾化吸入D.补充大量

维生素E.中医中药
230～234 题共用题干
女性，45 岁，因左侧面颊部皮肤及左侧舌部粘膜发红、起疱 3 天，伴剧痛来诊。查体：体温 38.5 度，左侧面部皮肤及左侧舌背、颊粘膜可见粟粒大小的密集成片的透明水疱，周围皮肤粘膜可见充血性红斑。化验：WBC7.8×10^9/L，中性 62％，淋巴 34％，拟诊断为带状疱疹。
230.本病例主要病变部位在 A.三叉神经第 1 支 B. 三叉神经第 2 支 C. 三叉神经第 3 支 D.面神经 E.颈神经
231.带状疱疹与单纯疱疹的最主要鉴别点在于 A.病因不同 B.前驱症状不同 C.病程长短不同 D.临床表现不同 E.全身症状不同
232.本病例可发生的最严重的并发症为 A.肺炎 B.脑炎 C.结膜炎 D.角膜炎 E.面瘫
233.你认为此时采取的各项治疗措施中，那项欠合理？A.口服抗病毒药物如无环鸟苷等B.注射聚肌胞C.维生素B_2 500μg＋维生素$B_1$100mg肌注隔日一次D.皮肤病损涂炉甘石洗液E.口腔局部封闭地塞米松＋普鲁卡因
234.患者曾在外院给予肌注青霉素 3 天，局部病损激光照射及口服多种维生素等措施，症状有所改善，但未完全消失，尤其是疼痛症状仍明显。疗效不佳的原因是A.未给予支持治疗B.未注射聚肌胞或转移因子C.诊断不正确D.局部未用消炎含漱液E.未给予卡马西平或肌注维生素B_1＋维生素B_{12}
235～237 题共用题干
男性，48 岁。肾移植术后五周，口腔粘膜糜烂、进食疼痛来诊。检查见上下唇内侧粘膜及双颊粘膜广泛充血发红，表面被覆较厚的白色伪膜呈斑片状，伴有轻度口臭。
235.该病例最可能的诊断是 A.球菌性口炎 B.坏死性溃疡性龈口炎 C.单纯疱疹 D.多形性红斑 E.复发性口疮
236.如要确诊，那项辅助检查对该病诊断既快捷又有较大帮助？A.活体组织检查 B.血常规及分类检查 C.肝肾功能检查 D.细菌培养 E.药敏实验
237.本病例治疗应选择那一类药物 A.甲硝唑 B.肾上腺皮质激素 C.青霉素 D.维生素 E.制霉菌素
238～241 题共用题干
女，35 岁，患甲状腺功能低下 3 年。突然高热、头痛、全身乏力，口腔粘膜及牙龈出现坏死性溃疡，上覆灰白性伪膜，有自发性出血及特异口臭
238.该患者最可能患有的疾病为 A.白血病 B.剥脱性龈炎 C.坏死性龈口炎 D.疱疹性龈口炎 E.球菌性口炎
239.引起该疾病最常见的致病菌是 A.金黄色葡萄球菌 B.溶血性链球菌 C.卡他球菌 D.梭状杆菌和螺旋体 E.牙龈卟啉菌
240.下列那项不作为该病例确诊的常规检查？A.病损区涂片及培养 B.血常规及分类检查 C.免疫功能测定 D.内分泌功能测定 E.活体组织检查

241.下列处理那项不适合该患者？A.口服交沙霉素及甲硝唑 B.全身给予高维生素高蛋白饮食 C.局部 1%～3%过氧化氢冲洗、含漱 D.积极治疗甲低 E.口服制霉菌素

242～246 题共用题干

女性，28 岁，持续低热 3 个月，伴乏力、盗汗。舌部溃疡 1 个月。体检：口腔舌部及口咽部粘膜溃疡，较深、蚕豆大小，表面伪膜污秽，基底有细小的颗粒状结节，触痛明显。

242.该患者可能的疾病为 A.创伤性溃疡 B.结核性溃疡 C.梅毒 D.癌性溃疡 E.深部真菌感染

243.为明确诊断，下列那项检查不适宜？A.OT 试验 B.Kveim 试验 C.病变组织涂片抗酸染色 D.活检 E.胸片

244.为尽早作出诊断，首选的检查方法为 A.血培养 B.胸透或胸片 C.标本动物接种 D.结核菌素试验 E.活检

245.口腔治疗最佳选择为 A.0.1%雷夫奴尔含漱 B.1%～2%普鲁卡因含漱止痛 C.2%普鲁卡因加地塞米松局部注射 D.链霉素 0.5g 局部注射，隔日 1 次 E.庆大霉素加氢化考的松雾化吸入

246.下列那条对否定结核病最具价值？A.结核菌素试验阴性 B.缺少结核病的中毒症状 C.涂片阴性 D.抗结核治疗反应欠佳 E.血沉不快

247～250 题共用题干

男性，36 岁。3 年前患空洞型肺结核，经治疗病情稳定。2 个月前下唇粘膜出现一较大溃疡，疼痛明显。经抗炎治疗 1 个月无效。活检确诊为口腔结核

247.下列描述中，符合口腔结核性溃疡的临床特征是 A.溃疡表浅，形状不规则，表面灰黄色伪膜 B.溃疡深大，基底呈粟粒状小结节，边缘不整齐，表面有污秽伪膜，似“鼠状”C.溃疡深大，基底有颗粒状突起，似“菜花状”，边缘及基底有硬结 D.溃疡较深，边缘轻微隆起，中央凹陷，表面有灰白伪膜，疼痛明显 E.溃疡表浅，面积较大，多为双侧分布

248.下列那项病理变化对结核性溃疡的诊断最具有价值？A.形成类上皮结节，中央为干酪样坏死 B.上皮坏死，形成溃疡 C.固有层炎性细胞带状浸润 D.上皮细胞出现非典型增生 E.基底细胞液化变性

249.若确诊为结核性溃疡，其正确治疗应为 A.不治疗，观察 B.休息和加强营养 C.增强机体免疫功能 D.全身给予异烟肼、链霉素和对氨基水杨酸钠标准治疗 18 个月 E.全身给予异烟肼、利福平和乙胺丁醇短程治疗 6 个月，口腔局部链霉素注射

250.忠告患者最重要的是 A.注意休息 B.加强营养 C.注意隔离 D.服从治疗，规则用药 E.定期复诊

251～254 题共用题干

女性，45 岁，患糜烂性扁平苔藓，经口腔局部雾化治疗 10 余次后出现口干、唾液粘稠，进食无味，刺激痛加重来诊。

251.此患者可能的疾病为 A.球菌性口炎 B.口腔念珠菌病 C.过敏性口炎 D.扁平苔藓 E.盘状红斑狼疮

252.体检时下列那一体症不可能出现 A.粘膜出现白色凝乳状斑点或斑膜 B.粘膜出现弥散性红斑 C.口角发红，皲裂形成 D.舌背丝状乳头萎缩 E.舌背中部出现白色角化斑块
253.为明确诊断，最可靠的辅助检查为A.血清铁及铁蛋白测定B.直接涂片检查C.外周血念珠菌抗体测定D.白念唾液培养E.叶酸、维生素B_{12}测定
254.上述诊断确立后，治疗措施中，那项不合理？A.局部使用抗生素软膏涂擦B.口服制霉菌素C.用苏打片或氯己定液清洗口腔D.隔离并注意餐具消毒E.口含华素片
255～258 题共用题干
男性，25 岁，因咽痛服增效联磺片后，舌背起庖，破溃后疼痛难忍，进食受限来诊。以往曾有类似病史，并且口服增效联磺片后发生。查舌背粘膜表面可见 0.8cm^2 ×1.2cm^2 界限清楚的糜烂面，表面渗出较多。
255.本病例最可能诊断为 A.急性疱疹型龈口炎 B.粘膜血庖 C.药物过敏性口炎 D.白塞病 E.接触性口炎
256.在采集病史时应特别注意询问 A.既往个人健康状况 B.吸烟史 C.家庭发病情况 D.既往用药史 E.局部有无创伤史
257.下列实验室检查对确诊最有帮助的是 A.血常规 B.血沉 C.出凝血时间 D.嗜酸细胞直接计数 E.血清钙
258.下列治疗措施中最重要的是 A.寻找并及时停用可疑药物 B.嘱患者多喝水或输液 C.口服大量维生素 C 及维生素 BD.保持口腔清洁，防止继发感染 E.口腔局部涂布溃疡膏
259～261 题共用题干
男性，32 岁，进食海鲜后，上唇突然肿胀，无明显全身症状。查体上唇肿胀明显局部光亮，色泽正常，触微硬有弹性，无压痛。
259.结合病史该病例最可能的诊断是 A.过敏性唇炎 B.血管神经性水肿 C.慢性唇炎 D.唇痈 E.唇疱疹
260.关于该病下列那项说法是错误的 A.好发于头面部疏松组织 B.发病迅速，消退也迅速 C.有服用特殊食物或药物史 D.经抗感染治疗即可好转或消退 E.严重者可造成窒息，须行气管切开
261.若该患者出现呼吸困难，应采取最为重要的措施是 A.寻找并及时清除过敏原 B.局部应用去炎松软膏 C.口服息斯敏或扑尔敏 D.静脉缓慢推注 10％葡萄糖酸钙 E.每隔 30 分钟皮下注射 0.1％肾上腺素 0.3～0.5ml 262～265 题共用题干
女性，35 岁，连续 3 年每年 3～4 月份下唇及舌背粘膜即开始溃烂，唇部结厚血痂，张口受限，进食困难。同时双手、双上肢皮肤起庖。在外院短期服强地松后症状逐渐好转，自愈。此次发作 2 周，与以往表现类似，口腔糜烂范围广泛，疼痛明显来诊。
262.该病可能的诊断是 A.过敏性口炎 B.多形红斑 C.天疱疮 D.白塞病 E.接触性口炎
263.本病发病诱因与那项因素无关？A.服用食物、药物 B.精神因素 C.微生物感染 D.寒冷刺激 E.女性内分泌改变

264.若出现眼、生殖器、肛门等多孔窍损害，有关预后判断，下列那项是错误的？A.严重眼损害，可造成视力减退，甚至失明 B.可伴有胃肠道并发症，引起食道炎、食道狭窄 C.上呼吸道受累，可表现肺炎、气胸等 D.生殖器发生病变，出现尿道炎、阴道溃疡 E.鼻粘膜受累出现溃疡，局部结厚血痂
265.病情严重者宜选用那种药物治疗？A.静脉滴注葡萄糖液 3000mlB.给予多种维生素 C.口服强地松，剂量服用时间视病情而定 D.口服扑尔敏或息斯敏 E.口腔局部对症治疗
266～269 题共用题干
男性，50 岁，反复发作口腔溃疡 30 余年，多见于唇、颊、舌等部位，每次 10 余个不等，近 3 年来发作频繁，几乎无间歇期。溃疡较大，愈合时间长，舌部有瘢痕形成。此次悬雍垂出现一大溃疡已 4 周，疼痛影响进食来诊。眼、外阴、生殖器无损。
266.该病例属那一类型？A.轻型口疮 B.口炎型口疮 C.腺周口疮 D.白塞病 E.唇疱疹
267.该类型溃疡的损害特点为 A.溃疡深大，呈弹坑状，边缘高起，表面有灰白色伪膜 B.溃疡深大，表面有灰白坏死膜，基底粘膜充血 C.溃疡深大，基底周围有浸润，呈菜花状 D.溃疡深大，基底有颗粒状小结节，呈鼠噬状 E.溃疡深大，形态不规则，与局部刺激物吻合
268.该病例可采取皮质激素局部封闭治疗，此疗法还可用于下列那种疾病？A.肉芽肿性唇炎 B.雪口病 C.结核性溃疡 D.单纯疱疹 E.白血病
269.该病例典型病理变化为 A.小涎腺周围炎细胞浸润，腺导管上皮增生 B.固有层少量炎性细胞散在浸润 C.固有层胶原纤维增生 D.上皮破坏，溃疡形成，表面有纤维素渗出物 E.小血管管壁增生
270～274 题共用题干
男性，26 岁，反复发作口腔溃疡 1 年。近半年感膝关节疼痛，伴阴茎溃疡 2 次。体检发现颊、下唇、舌背粘膜各见一约绿豆大小的溃疡，圆形，表面有黄色伪膜，。臀部肌肉注射处可见小脓疱。
270.此患者最可能诊断为 A.克隆病 B.Felty 综合征 C.白塞病 D.干燥综合症 E.Reiter 综合症
271.该病属 A.自身免疫病 B.细菌感染 C.病毒感染 D.传染性疾病 E.病因不清
272.以下那项检查对该病有诊断价值 A.ESR 增快，蛋白电泳球蛋白增高 B.尿蛋白（＋＋）C.血小板减少 D.肝肾功能异常 E.血红蛋白低于正常
273.下列那项说法不正确？A.外周血可检出抗口腔粘膜抗体 B.病人可出现严重的中枢神经系统病变 C.对皮质激素治疗效果差 D.血沉加快，ANA（＋）E.眼部病变可导致失明
274.该患者在体检时，除外那项体症，余均可出现？A.口腔溃疡B.雷诺现象C.针刺反应阳性D.皮肤蝶形红斑E.虹膜睫状体炎
275～278 题共用题干

男性，56 岁，右侧舌缘中部溃疡 3 周，来诊，查患者下颌 65|56 残根，边缘锐利，右侧舌缘中部可见一 0.6cm²×0.8cm² 大小的不规则溃疡，表面渗出较少，周围组织水肿明显，触局部稍硬。曾在外院治疗疼痛有所减轻，但溃疡未愈。

275.该患者可能诊断为 A.腺周口疮 B.癌性溃疡 C.结核性溃疡 D.创伤性溃疡 E.化脓性肉芽肿

276.若怀疑为创伤性溃疡，体检时应注意检查 A.溃疡周围及对颌有无刺激物，刺激物是否与溃疡相吻合 B.溃疡基底有无浸润 C.溃疡形态特征 D.患者全身状况 E.口腔卫生情况

277.该病例首选治疗措施为 A.局部止痛处理 B.拔除 65|56 残根 C.观察，不处理 D.活检 E.含抗生素漱口液

278.该病例处理后，应要求患者 A.任意择期复诊 B.1 周内复诊 C.3 周内复诊 D.1 个月内复诊 E.3 个月内复诊

279～283 题共用题干

患者 1 年来口腔粘膜反复起庖、破溃，此起彼伏，伴有疼痛。检查发现：口腔粘膜广泛云雾状水肿，有多处鲜红糜烂面，周围有灰白色疱膜，撕取疱膜时可同时揭去周围正常粘膜。

279.若探针可探入糜烂周围粘膜下，这叫做

A.探诊实验

B.棘层松解现象

C.刺激实验

D.西墨实验

E.雷诺现象

280.病人还可以有以下症状，除了

A．出现皮损

B．吞咽困难

C．淋巴结肿大

D．指甲纵嵴

E．　唾液增多

281.病人还可能

A.剧烈呕吐

B.呼吸困难

C.失去水电平衡

D.盗汗

E.腹泻

282.病人还可能有下列症状，除了

A.发烧

B.乏力

C.食欲减退

D.有骚痒感

E.咳嗽

283.可以用下列方法进一步检查，除了

A.甲基氨蓝染色

B.活检

C.脱落细胞涂片
D.直接免疫荧光检查
E.查血清抗核抗体

284－287 题共用题干：女性，36 岁，因口腔粘膜复发起泡 1 年多就诊。起泡与进食无关，泡损可破溃形成溃疡。临床检查可见下唇内侧粘膜有直径 5㎜ 的水疱，探针无法探入到疱损周围粘膜下，涂片未见 tzanck 细胞。患者不曾用过任何抗免疫治疗。

284.该患者的诊断可能是
A.疱型扁平苔藓
B.天疱疮
C.黏液囊肿
D.多形红斑
E.类天疱疮

285.本病损的好发部位是
A.颊粘膜
B.舌粘膜
C.牙龈
D.唇粘膜
E.口底粘膜

286.本病还可以有以下表现，除了
A.关节疼痛
B.悬雍垂缺损
C.眼结合膜炎
D.小口畸形
E.皮肤疱损

287.本病组织病理学的特点是
A.基底细胞液化变性
B.上皮下疱形成
C.有致密淋巴细胞浸润带
D.上皮内疱形成
E.出现胶样小体

288－289 共用题干：女性，45 岁，自觉右颊粘膜粗糙感 1 个月，有时伴刺激痛。临床检查见双颊粘膜有网状白色条纹，右颊粘膜充血。

288.以下哪项还可作为本病的诊断依据？
A.眼结膜充血
B.鼻充血
C.皮损有 wickham 条纹
D.外阴溃疡病史
E.月经紊乱

289.以下哪项对作出诊断最为主要
A.直接免疫荧光检查
B.活检组织病理检查
C.脱落细胞涂片检查
D.病损组织细胞检查

E.病损甲苯胺蓝染色

290－291 共用题干：女性，36 岁，发现舌苔红色斑块 1 年，病损时常变换位置，无自觉症状。

290.患者可能有

A.舌活动受限

B.自发痛

C.圆形或椭圆形剥脱病损融合形成地图状

D.剥脱区微突起

E.发病与口内 PH 值有关

291.患者的诊断可能是以下名称，除了

A.游走性舌炎

B.地图样舌炎

C.地图舌

D.剥脱性舌炎

E.萎缩性舌炎

A4 型题

292－294 题共用题干：女性，39 岁，因口腔粘膜反复起泡 9 个多月就诊，起泡与进食无关，病损可破溃形成溃疡。临床检查可见上下牙唇颊侧牙龈有多个水疱或糜烂面，探诊无法探入疱损周围粘膜下，左侧舌腭弓粘膜有瘢痕挛缩，患者不曾用过任何抗免疫治疗。

292.关于该疱损的治疗下列哪项可能是正确的？

A.本病只需局部治疗

B.本病需要全身和局部治疗

C.本病需全身治疗，但不需要用抗生素

D.本病只需激素治疗即可

E.治疗中每 2 周复查一次白细胞

293.若医生用激素治疗一段时间之后，病人出现下肢无力，原因可能是

A.下肢血循环障碍

B.血钠升高

C.血压升高

D.血钙降低

E.血压降低

294.应用激素后病人还可能出现以下症状，除了

A.嗜睡

B.食欲旺盛

C.痤疮

D.白色念珠菌感染

E.胃溃疡加重

295－297 题共用题干：男性，35 岁，发现右上第二双尖牙腭侧牙龈发白 3 天，检查见患侧有 1cm×0.5cm 白色角化斑块，表面棘刺状。

295.下列哪项信息无助于诊断或鉴别诊断？

A.家族患病史

B.梅毒病史

C.局部残根、残冠

D.药物过敏史
E.吸烟
296.下列哪项措施对确立诊断最为关键?
A.涂片检查
B.直接免疫荧光检查
C.组织病理检查
D.甲苯胺蓝染色
E.血化验
297.下列哪项是本病治疗措施之一？
A.追踪观察
B.调整免疫
C.给予抗生素
D.心理治疗
E.激素治疗
298－300题共用题干：男性，56岁，下唇糜烂半年不愈。临床检查见下唇唇红有1cm×2cm红色萎缩斑，中央微凹陷，边缘隆起有放射状白色角化条纹。口腔内未见他处病损。
298.如果病人同时患皮损常见部位是
A.前胸
B.腰背
C.四肢
D.头面部
E.躯干
299.以下是应该对病人所作的进一步检查，除了
A.过敏试验
B.组织病理检查
C.免疫病理检查
D.皮肤病损检查
E.血清抗核抗体
300.下列哪项不是该病的病理表现？
A.出现上皮角栓
B.棘层变薄
C.固有层淋巴细胞带状浸润
D.胶原纤维变性
E.出现胶样小体
301－304共用题干：女性，60岁，双侧口角糜烂1个月。临床检查见口内无牙颌，垂直距离短，双口角皮肤、粘膜充血、湿白、龟裂。
301.若欲确定该病病因应该作以下检查，除了
A.甲苯胺蓝染色
B.细菌培养
C.霉菌培养
D.口角涂片
E.血清维生素水平测定
302.垂直距离变短可能造成

A.口角干燥
B.营养不良
C.口角潮湿
D.不引起口角病变
E.口内不适

303.若欲确定患者有无白色念珠菌感染，应该
A.查见念珠菌孢子
B.查见念珠菌菌丝
C.根据临床症状确诊
D.根据病理结果确诊
E.根据血清抗体测定结果确诊

304.若欲确定患者有无球菌感染，应该
A.根据病理结果确诊
B.根据临床症状确诊
C.根据以往病史确诊
D.根据细菌培养确诊
E.根据药敏实验确诊

305－307 共用题干：男性，1 岁，双侧口角糜烂 1 个月，伴哭闹不食。临床检查见口内颊、腭粘膜有白色凝乳状绒膜，粘膜充血，口角皮肤粘膜充血、湿白、龟裂。

305.下列哪项不宜作为诊断依据？
A 白细胞计数.
B.涂片检查
C.微生物培养
D.甲苯氨蓝染色
E.临床症状

306.该病人的诊断最可能是
A.细菌感染
B.真菌感染
C.营养缺乏
D.病毒感染
E.螺旋体感染

307.患儿很可能是
A.内分泌紊乱
B.有家族遗传病史
C.人工喂养
D.母乳喂养
E.全身抵抗力低下

308－311 题共用题干：男性，37 岁，出现口腔溃疡 1 周，经检查舌背有一钱币大小的孤立溃疡，表面有棕色薄痂，触之有软骨样感觉。患者承认与另一梅毒患者有过性接触史。

308.该患者的病损属于
A.二期梅毒损害
B.一期梅毒损害

C.先天梅毒损害
D.后天梅毒损害
E.三期梅毒损害

309.常发生在感染后
A.感染后第 1 周
B.感染后第 2 周
C.感染后第 3 周
D.感染后第 4 周
E.感染后第 5 周

310.临床症状为
A.无痛
B.疼痛
C.瘙痒
D.烧灼感
E.刺激痛

311.此期血清学反应常为
A.阳性，但滴度低于 40
B.强阳性
C.弱阳性
D.阴性
E.阴性，滴度大于 10

B1 型题

A.单纯疱疹 B.膜性口炎 C.坏死性龈口炎 D.疱疹性咽峡炎 E.手足口病

312.由 I 型单纯疱疹病毒引起
313 由梭螺杆菌引起
314.由金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌引起
315.由柯萨奇病毒A_4 引起

A.疱疹性龈口炎B.唇疱疹C.急性坏死性龈口炎D.鹅口疮E.复发性口疮

316.唇颊舌等口腔粘膜反复出现散在的圆形或椭圆形溃疡为
317.幼儿有发烧史，后在牙龈上腭等处的口腔粘膜出现簇集的针头大小的透明水疱应诊断为
318.婴儿口腔粘膜出现白色凝乳状的斑点或斑块，不易擦掉，应诊断为

319.中年女性下唇及周围皮肤灼痛搔痒，局部出现丛集成簇的针头大小的透亮水疱，破溃后干瘪结痂，其诊断为

A.婴幼儿 B.青壮年 C.学龄前儿童 D.中老年 E.任何年龄

320.急性疱疹性龈口炎多见于
321.手足口病主要发生在
322.带状疱疹多见于

A.口炎型口疮 B.疱疹性龈口炎 C.带状疱疹 D.疱疹性咽颊炎 E.手足口病

323.反复发作，溃疡散在，无皮肤损害，应诊断为

324.婴幼儿多见，急性病程，病损特征为成簇水泡，可伴皮损，应诊断为
325.任何年龄均可发生，病变可见于皮肤及口腔粘膜，疱疹沿神经排列，不超过中线，诊断为
326.有前驱症状，继而在口腔粘膜，手掌，足底出现水泡，丘疹等病损，5～10 天愈合，应诊断为
327.病损分布于口腔后部，为丛集小水疱，牙龈不受侵犯，全身反应轻，应诊断为
A.5%无环鸟苷软膏 B.口腔溃疡膏 C.鱼石脂软膏 D.克霉唑软膏 E.达克宁霜
328.带状疱疹的局部用药为
329.口炎型口疮的局部用药为
A.0.05%洗必太液 B.0.25%金霉素液 C.1%～2%普鲁卡因 D.3%双氧水 E.0.05%高锰酸钾液
330.球菌性口炎局部治疗首选的漱口水是
331.鹅口疮首选的漱口水是
332.急性坏死性龈口炎首选的漱口水是
A.鹅口疮 B.膜性口炎 C.急性坏死性龈口炎 D.疱疹性口炎 E.口炎型口疮
333.球菌性口炎又称为
334.急性伪膜型念珠菌病又称为
335.坏疽性口炎又称为
A.菌丝和孢子 B.梭状杆菌和螺旋体 C.病毒水疱和包涵体 D.大量细菌及白细胞 E.分枝杆菌
336.疱疹性龈口炎病损区涂片检查可见
337.口腔念珠菌病病损区直接镜检可见
338.急性坏死性龈口炎病损区涂片检查可见
339.球菌性口炎擦拭物涂片检查可见
340.结核性溃疡擦拭物涂片检查可见
A. Ⅰ型单纯疱疹病毒 B.牙龈卟啉菌 C.奋森螺旋体和梭状杆菌 D.变形链球菌 E.白色念珠菌
341.坏疽性口炎的致病菌为
342.疱疹性龈口炎的致病菌为
A.制霉菌素 B.交沙霉素加甲硝唑 C.皮质激素 D.青霉素 E.三氮唑核苷
343.急性疱疹性龈口炎首选药物
344.球菌性口炎首选药物
345.鹅口疮首选药物
346.坏疽性口炎首选药物
A.结核性溃疡 B.创伤性溃疡 C.癌性溃疡 D.腺周口疮 E.梅毒下疳
347.溃疡形态不规则，边缘隆起，溃疡形态和刺激物相吻合
348.溃疡深大，呈菜花状，基底及边缘硬，有浸润，疼痛不明显
349.溃疡边缘不规整，基底有桑葚状小结节，疼痛明显

350.溃疡深大，边缘隆起，呈弹坑样，表面有灰黄色假膜，基底软
A.芽生孢子 B.厚膜孢子 C.假菌丝 D.真菌丝 E.酵母样菌
351.白色念珠菌的正常存在形式
352.白色念珠菌的致病形式为
353.白色念珠菌的鉴定形式为
A.口腔粘膜可见边界清楚的红斑，伴口角粘膜糜烂、皲裂 B.有服用大剂量抗生素病史，表现舌粘膜发红、乳头萎缩灼痛明显 C.舌背中央后部粘膜出现菱形的丝状乳头萎缩区，基底粘膜充血发红，表面可出现结节状增生 D.多见于婴幼儿及老年体弱者，表现为充血的口腔粘膜上出现白色凝乳状斑点或斑膜，无明显自觉症状 E.口角内侧粘膜表面出现致密白色斑块，表面粗糙，伴双侧口角皲裂
354.急性伪膜型念珠菌病的临床特征为
355.急性红斑型念珠菌病的临床特征为
356.慢性红斑型念珠菌病的临床特征为
357.慢性增殖型念珠菌病的临床特征为
358.正中菱形舌的临床特征为
A.皮肤红斑、丘疹、水疱，口腔大小不等的水疱，破溃后呈糜烂面。反复发作，部位固定 B. 皮肤红斑、丘疹、水疱或斑丘疹多见于手、足底部皮肤或臀部皮肤，口腔为相互融合的疼痛性小水疱 C.皮肤结节性红斑、毛囊炎、疖肿。口腔为反复发作的圆形或椭圆形溃疡，另可出现眼及外生殖器病损 D.皮肤大疱，口腔粘膜大小不等的透明水疱 E.皮肤蝶形红斑，口腔粘膜萎缩型红斑，周围有短小的放射状条纹围绕
359.手足口病的的临床表现为
360.白塞病的临床特征为
361.药物过敏性口炎的临床特征为
A.固定药疹 B.巨型巡麻疹 C.斯展综合症 D.接触性口炎 E.托牙性口炎
362.药物过敏性口炎又称
363.血管神经性水肿又称
364.多形渗出性红斑又称
A.发病迅速，消退迅速，反复发作，肿胀区微硬，无压痛 B.发生较缓慢，有牙痛史或口腔病灶。肿胀区可有波动感，有压痛 C.病情时轻时重，肿胀消退缓慢，始终不能恢复正常，触肿胀区韧，有弹性 D.发病急，组织肿胀明显，但局限，局部组织红肿热痛 E.发病急剧，组织肿胀明显，表面有坏死性溃疡形成
365.血管神经性水肿的诊断依据为
366.颌面部蜂窝织炎的诊断依据为
367.肉芽肿性唇炎的诊断依据为
A.面、四肢对称性靶形红斑 B.面部突出部蝶形红斑 C.四肢紫色扁平丘疹 D.手掌、足底、臀部皮肤丘疹、斑疹和水疱 E.下肢结节性红斑
368.多形渗出性红斑典型皮损为
369.慢性盘状红斑狼疮典型皮损为

370.扁平苔藓典型皮损为
371.手足口病典型皮损为
372.白塞病的皮损特征为
A.口腔大面积充血、水肿、渗出、糜烂，伴鼻腔、生殖器、肛门、眼损害 B.双侧口角湿白、糜烂、皲裂，伴皮肤、生殖器及眼病变 C.口腔、生殖器溃疡，针刺反应阳性，眼反复发生结膜炎、角膜炎等 D.口腔反复溃疡，伴结肠溃疡 E.口腔粘膜特别时下唇出现雀斑样色素沉着，伴胃肠道息肉
373.维生素B_2缺乏症表现为
374.白塞病临床表现为
375.斯展综合症表现为
A.轻型口疮 B.疱疹样口疮 C.腺周口疮 D.白塞综合症 E.疱疹样龈口炎
376.溃疡数目少，1～5 个不等，圆形或椭圆形，表浅，7～14 天愈合
377.溃疡数目多，为 10～100 个不等，散在分布，周围粘膜充血水肿广泛
378.溃疡面积大为 0.5～2cm^2 不等，深达粘液腺，边缘隆起，表面凹陷，呈弹坑样，常 1～2 个，2～4 周愈合
379.口腔溃疡同时伴有或交替出现眼、外阴、皮肤病变
A.溃疡、水肿、增生 B.糜烂、溃疡、坏死膜形成 C.充血、水肿、溃疡、继发白色念珠菌感染 D.大疱、溃疡 E.结节
380.机械性刺激因素可导致口腔粘膜出现
381.放射性损伤可导致口腔粘膜出现
382.化学性烧伤可导致口腔粘膜出现
A.鹅口疮 B.抗生素舌炎 C.义齿性口炎 D.膜性口炎 E.莱氏综合症
383.急性伪膜型念珠菌病又称为
384.急性萎缩型念珠菌病又称为
385.慢性萎缩型念珠菌病又称为
A.手足口病 B.带状疱疹 C.疱疹性咽颊炎 D.疱疹性口炎 E.口炎型口疮
386.发生在口腔粘膜的非角化区
387.手掌、足底、臀部皮肤和口腔粘膜同时有疱疹
388.病损织发生在口腔后部
389.病损沿三叉神经分布的区域分布
390.单纯疱疹病毒引起
A.癌性溃疡 B.结核溃疡 C.腺周口疮 D.创伤性溃疡 E.中线恶性网织细胞增生症
391.有口腔溃疡复发史
392.溃疡进行性迅速发展，基底有浸润硬结
393.溃疡附近有残根残冠刺激
394.溃疡表面有污秽假膜，恶臭
395.病例表现有干酪样坏死
A.类天疱疮

B.天疱疮
C.艾滋病
D.多形红斑
E.唇疱疹
396.有获得性免疫缺陷
397.出现上皮下疱
398.有棘层松解现象
A.是否出现白色角化条纹
B.发病的缓急
C.疱损与上皮基底膜的关系
D.疱损愈合后留下瘢痕
E.是否出现蝶型红斑
399.类天疱疮与疱型扁平苔藓的鉴别的关键
400.类天疱疮与多形红斑的鉴别点之一
401.粘膜良性类天疱疮的特点之一是
402.病理学区别天疱疮和类天疱疮时的主要根据
A.慢性唇炎
B.缺铁性吞咽困难
C.白斑
D.粘膜下纤维变性
E.扁平苔藓
403.与吸烟关系密切
404.与精神情绪关系密切
405.与咀嚼槟榔关系密切
A.单纯疱疹
B.地图舌
C.白色念珠菌病
D.慢性唇炎
E.白色角化病
406.易与白斑伴发
407.应与白斑鉴别
A.扁平苔藓
B.盘状红斑狼疮
C.单纯疱疹
D.地图舌
E.皮脂腺异位
408.发病因素常为精神情绪因素
409.发病与日光照射关系密切
A.扁平丘疹
B.淋巴细胞浸润带
C.白色条纹
D.皮肤
E.免疫异常
410.是扁平苔藓的发病因素之一

411.是扁平苔藓的发病部位之一
412.是扁平苔藓在口腔粘膜的主要病损
413.是扁平苔藓病损镜下所见
414.是扁平苔藓皮肤病损的主要表现
A.女性，36岁，右颊粘膜刺激感两周，检查见相对于右下7的颊粘膜有1cm×1cm白色网状条纹，基底粘膜充血，右下7有颊面银汞充填物。
B.女性，56岁，因女儿丢钱而着急上火，近1周感双颊粘膜粗糙，临床检查见双颊白色网状条纹广泛伸展至上下移行沟。
C.男性，40岁，已确诊为扁平苔藓。1周来右舌腹疼痛明显，要求治疗。检查见有舌腹糜烂1cm×2cm。
D.女性，50岁，左下移行沟持续糜烂2个月不愈，一直坚持局部上药但不奏效。临床检查见双颊粘膜广泛白色条纹，右颊充血，左下移行沟1cm×2cm糜烂。
E.女性，舌背发白3个月，无任何自觉症状。临床检查见舌背3块黄豆大小的白色角化斑块，表面珠光样，组织活检证实为扁平苔藓。
415.病损基底部注射地塞米松
416.给予心理调节治疗可暂时不予药物治疗，观察
417.暂时不予治疗，观察
418.局部抗炎、止痛、促进愈合措施
A.多形红斑
B.蝶型红斑
C.靶形红斑
D.疱形红斑
E.萎缩红斑
419.可能为白色念珠菌病的表现之一
420.多形红斑的典型皮损
421.盘状红斑狼疮的典型皮损
A.牙龈
B.上颚
C.颊粘膜
D.下唇唇红
E.舌背
422.扁平苔藓的好发部位
423.盘状红斑狼疮的好发部位
424.类天疱疮的好发部位
A.内分泌失调
B.舔唇不良习惯
C.感冒
D.残根残冠的刺激
E.消化不良
425.慢性唇炎的病因
426.创伤性溃疡的病因
427.疱疹性口炎的诱因

A.唇肿胀，糜烂，干燥，脱屑，结痂，疣状或颗粒样增生，可出现白色条纹。
B.有日光照射历史，唇红部以糜烂为主要特征。
C.唇肿胀，触之有散在，粟粒状小结节，有透明黏液溢出于唇表面呈水珠状。
D.唇弥漫性肿胀，触之韧感，皮肤暗红色
E.唇突然肿胀，有可凹性，24 小时消退

428.血管神经源性水肿
429.光化性唇炎
430.腺性唇炎
431.肉芽肿性唇炎
A.以肿胀为主要症状
B.以脱屑为主要症状
C.以龟裂为主要症状
D.以糜烂为主要症状
E.以淋巴增生为主要症状

432.肉芽肿性唇炎
433.光化性唇炎
434.良性淋巴组织增生性唇炎
A.口服氯化喹啉
B.放射治疗
C.局部注射皮质激素
C.手术成形
E.湿敷

435.用于治疗所有唇炎
436.用于治疗光化性唇炎
437.用于治疗肉芽肿性唇炎和良性淋巴增生性唇炎
438.用于治疗病情稳定的肉芽肿性唇炎
439.用于治疗肉芽肿性唇炎、良性淋巴增生性唇炎和腺性唇炎
A.鼻炎、舌炎
B.舌炎、咽炎
C.丝状乳头萎缩
D.轮廓乳头萎缩
E.舌炎、唇炎

440.维生素 B 缺乏除了有口角炎外，还表现为
441.维生素 B 缺乏时，舌背表现为
A.疱疹性口炎
B.地图样口炎
C.伪膜样口炎
D.抗生素性口炎
E.坏死性口炎

442.口腔粘膜出现了红斑区，外围隆起白色边缘，应称为
443.单纯疱疹Ⅰ型病毒引起的口炎，称为
444.由于长期服用抗生素、激素而导致的白色念珠菌感染

445.细菌引起的口炎
446.由奋森氏螺旋体引起的口炎
A.切牙乳头
B.轮廓乳头
C.叶状乳头
D.丝状乳头
E.菌状乳头
447.密集分布在整个舌背
448.位于双侧舌根
449.散在分布于舌背
450.呈人字型排列在舌背后部
A.通过生殖器官接触得病
B.通过胎盘累及胎儿
C.握手
D.接吻
E.输血
451.先天性梅毒
452.后天性梅毒
453.不得梅毒
A.三期梅毒
B.先天梅毒
C.后天梅毒
D.一期梅毒
E.二期梅毒
454.梅毒下苷发生在
455.梅毒粘膜斑发生在
456.梅毒橡胶肿发生在
457.桑椹牙发生在
A.T4 细胞数正常，HIV 血清抗体阳性
B.T4 细胞数正常，HIN 血清抗体阴性
C.T4 细胞数下降，T4/T8 比值倒置，HIV 血清抗体阳性
D.T4 细胞数升高，HIV 血清抗体阳性
E.T4 细胞数下降，HIV 血清抗体阳性
458.HIV 感染者
459.ARC
460.健康者
A.涂擦克霉唑软膏
B.口服维生素 B2
C.涂擦抗生素软膏
D.口角区清洁
E.恢复上下颌间距离
461.对无牙颌患者，唾液常集于口角者，应
462.治疗营养不良性口角炎应
463.治疗球菌性口角炎应

464.治疗任何口角炎都应进行

A.二期梅毒损害

B.一期梅毒损害

C.先天梅毒损害

D.后天梅毒损害

E.三期梅毒损害

465.玫瑰疹是

466.梅毒牙是

467 蔷薇疹是

468.橡胶肿是

469.下疳是

B_2型题

A. 叶状乳头

B. 轮廓乳头

C. 菌状乳头充血、水肿

D. 镜面舌

E. 地图舌

F. 沟纹舌

G. 毛舌

H. 菱形舌

I. 口角皲裂

470. 丝状乳头过度增生

471. 菌状乳头炎

472.常与地图舌并存

473.又称游走性舌炎

474.呈人字形排列

475.丝状乳头全部萎缩

476.咽部炎症可波及之

477.张口受限

478.舌背人字沟前舌乳头剥脱

A. 舌后部的舌缘两侧

B. 舌前方及舌旁边

C. 舌背中部

D. 口底舌腹

E. 舌根部

479. 舌炎症时菌状乳头出血。菌状乳头常位于

480. 叶状乳头在人类已退化。呈皱褶状位于

A. 均匀弥散的灰白色

B. 呈带状

C. 网状

D. 灰白色带白色棉絮状

E. 花纹状

481．白色角化病颊部损害特点是
482．白色角化病在颊腭损害特点是
483．白色角化病在唇部损害特点是
A．口角区颊粘膜
B．口底舌腹
C．唇部
D．牙龈
E．舌背
484．颗粒状白斑发生部位多见于
485．皱纸状白斑发生部位多见于
486．疣状白斑发生部位多见于
A．尖牙至第一磨牙后颊侧后龈
B．上下前牙牙龈
C．任何牙龈
D．右侧牙龈
E．左侧牙龈
487．慢性铅龈中毒的龋牙龈出现龈线，常位于
488．铋中毒在牙龈上好发部位
A．呈均匀状散的灰白色
B．损害呈带状
C．网状
D．斑块状
E．纹状
489．白色角化病在颊部损害特点为
490．白色角状病在硬腭损害特点为
A．揭疱壁试验阳性
B．揭疱壁试验阴性
C．皮肤上气斑水疮上疔
D．口腔粘膜一
E．生殖器溃疡形成瘢痕
491．类天疮疮
492．寻常型天疮疮
493．白色角氏病发病因素，除外
A．患肺结核病人，抵抗下降
B．物理与化学因素（烟、酒、醋、辣、烫）
C．残根残冠，不良修复，与等机械性刺激

D．尖锐的轴边缘

E．维生素 A 缺乏

494．肾上腺素治疗变态反应性度疮疮的作用是

A．激治腺苛治状面毒

B．使细胞内环磷酸腺苛浓度增加

C．阻止生物治性物质的释放

D．对增殖活跃的淋巴细胞有较巅的毒性

E．抑制免疫系统

X 型题

495．白色角化病基本特点：

A．初起一般没有自觉症状

B．当角化吸显或范围广泛时，才会出现粗糙或干涩感

C．损害初起呈灰白色

D．角化越明显则越白

E．粘膜皱褶仍保持浅粉红色

496．舌背粘膜白色角化病的临床特点

A．大致呈方形或长方形

B．被红纹分隔成方形小斑斑块

C．角化明显时损害区稍隆起

D．丝状乳头粗短绞合

E．小斑块之间的红纹不消失

497．白色皱襞性龈口炎是少见的

A．常染色体显性遗疡传病

B．损害呈灰白色或乳白色

C．表现为皱襞状，海绵状，磷底状粗厚颗性细胞

D．这部位的得抹粘膜的柔与弹性

E．几股维甲酸疗效显著

498．下列哪些疾病属于癌前损害

A．.慢性光化性唇炎

B.口腔粘膜下纤维变性

C．白斑

D．赤斑

E．盘状红斑狼疮

499．白色角化病发病因素有

A．患肺结核病抵抗力下降

B．物理与化学因素（烟、酒、辣、烫）

C．残根残冠，不良修复多体，等机械刺激

D．尖锐的釉质边缘

E．维生素 A 缺乏

500.扁平苔藓的病因很多，目前一般认为发病可能与哪些因素有关

A．细菌感染

B．神经精神障碍

C．病毒感染

D．自身免疫

E．遗传

501．白斑的发病中局部刺激因素具有主要的作用外，全身因素中

A．白色念珠菌感染

B．遗体

C．缺铁性贫血

D．维生素 B12 和叶酸缺乏

E．梅毒以及射线口开症等

502．白斑应及早以放手术切除，当白斑出现

A．皲裂

B．溃疡此基底变硬

C．表面增厚显著时

D．充血水肿

E．萎缩

503．扁平苔藓皮肤损害特点为

A．扁平面有光泽的浅紫红色多角形丘疹

B．丘疹如绿豆大小

C．边缘境界清楚

D．质地坚硬干燥

E．融合后状如苔藓

504．口腔粘膜扁平苔藓损害主要特征为

A．白色斑块

B．珠光白色条纹

C．白纹可以向各个方向延伸

D．整个线条不被红纹切割

E．萎缩的赤斑上点缀着结节

505．哪些部位能看到异位皮脂腺

A．颊粘膜

B．唇红部

C．口底
D．舌腹
E．上腭
506．扁平苔藓生殖器粘膜损害
A．常呈暗红色的圆此椭圆形斑状
B．表面可见白色网状损害
C．容易发生糜烂
D．丘疹隐状干粘膜下
E．珠光白色条纹
507．异位皮脂腺临床特点
A．呈淡黄色颗粒
B．可以丛集散在
C．除了非常浅表的
D．一般都隐于粘膜下
E．常发生糜烂
508．口腔角平苔藓的病理特点
A．过度正角化伴角质栓
B．角化过度与角化不全
C．伴粒层肥厚基高细胞坏死液化变性.
D．基底膜下有大量淋巴细胞浸润
E．在棘层，基底层或结缔组织内可看到圆形的嗜酸性胶状体
509．赤斑已从萎缩与异常增生阶段发展为原位癌或浸润癌，故有时亦称
A．颗粒—结缔状赤斑
B．增殖性红斑
C．或红斑瘤
D．均质型赤斑
E．颗粒状赤斑
510．粘膜炎是一种
A．均质型赤斑
B．是红色良性粘膜统称
C．创伤、感染、药疹等多种原因
E．这种炎症反应通常也称红斑
511．赤斑的病理改变
A．角质层消失仅有 2-3 层棘细胞
B．核浆比例改变
C．核深染

D．正角质与棘层肥厚

E．基底细胞液化变性

512．盘状红斑狼疮的病因不明，可能与下列因素有关

A．高血压

B．糖尿病

C．胃溃疡

D．遗传

E．病毒

513．唇部盘状红斑狼疮在糜烂发生前与愈合初期经常出现有诊断价值的三种现象

A．毛细血管扩张充血

B．特异性血红色和柔软性

C．损害的粘膜侧出现白色弧形围线

D．损害的皮肤侧出现黑色弧形围线

E．有时在损害范围内出现散在的针变状白色小点

514．盘状红斑狼疮病理改变有

A．过度正角化伴角质栓

B．上皮钉萎缩

C．基底层液化变性

D．炎症细胞（主要是淋巴细胞）浸润见于扩张的毛细血管周围与浅表固有层，

但在紧贴上皮的区域则相对减少

E．该区域能被过碘酸雪夫染色而类似基底膜增原

515．盘状红斑狼疮实验室检查有时可见

A．血沉增快

B．抗表皮细胞间质的自身抗体——IgG 增高

C．丙种球蛋白增高

D．类风湿因子阳性

E．抗一抗体阳性

516．磷酸氯化喹啉具有

A．抗组织胺与免疫抑制作用

B．有抑制血管渗透性亢进

C．稳定深酶体膜以免水解酶的释放

D．抗肿瘤作用

E．能抑制 DNA 的合成

517．磷酸氯化喹啉的主要副反应

A．溶血性贫血
B．不可逆性失明与耳聋
C．心率失常，心跳骤停
D．白细胞减少
E．胃肠道反应

518．湿疹性唇炎
A．慢性唇炎
B．光化性唇炎
C．腺性唇炎
D．肉芽肿型唇炎
E．良性淋巴增生性唇炎

519．湿疹糜烂型唇炎的病因
A．空气干燥、高温作业
B．反复持久的日光曝晒
C．不良习惯（舐唇、咬唇）
D．病灶（肺结核、肝炎等）
E．不良修复体

520．良性淋巴增生性唇炎切片上，固有层主要表现为
A．淋巴样滤泡形成
B．密集的各种炎细胞浸润
C．组织细胞常位于滤泡中心
D．其外围为淋巴细胞
E．有嗜酸性胶状体（布氏体）

521．湿疹糜烂型唇炎湿敷治疗时可用
A．0.1%利凡诺液
B．1:5000 呋喃西林液
C．3%盐水
D．3%硼酸水
E．5%碘甙（疮疹净）

522．湿疹糜烂型唇炎治疗可用
A．湿敷
B．皮质激素
C．氯喹
D．氮—氖激光局部照射
E．维甲酸

523．腺性唇炎治疗可用

A．维甲酸
B．昆明山海棠
C．雪公藤
D．局部注射强的松龙混悬液
E．放射治疗如用同位素磷贴敷

524．肉芽肿性唇炎治疗可用
A．皮质激素
B．放射治疗
C．手术切除
D．氦—氖激光
E．药物离子导入

525．口角炎种类较多有
A．球菌性口角炎
B．维生素缺乏性口角炎
C．真菌性口角炎
D．外伤性口角炎
E．炎症性口角炎

526．真菌性口角炎与球菌性口角炎鉴别诊断可采用
A．病理检查
B．穿刺
C．涂片
D．PAS 染色
E．免疫荧光

527．地图舌病因不明，在儿童与下列哪些因素有关
A．消化不良
B．肠寄生虫
C．维生素 B 族缺乏
D．梅毒
E．淋病

528．地图舌病因不明，在成年人与下列哪些因素有关
A．贫血
B．胃肠功能紊乱
C．情绪
D．病灶感染
E．肝炎

529．舌的疾病包括

A．地图舌
B．沟纹舌
C．毛舌
D．正中菱形舌炎
E．萎缩性舌炎

530．地图舌的临床表现
A．舌背丝状乳头与菌状乳头剥脱
B．微凹陷
C．形成光滑的红色剥脱区
D．其边缘为白色 稍高起的弧形、圆形或椭圆形所包围
E．有虹膜状红斑

531．沟纹舌又名裂纹舌，主要表现为
A．在舌背的纵横沟纹
B．沟纹的深浅、长短不一
C．随年龄增长可逐渐加重
D．年轻人和老年人均有
E．男女不限，与地图舌同时存在

532．毛舌的临床表现特点
A．多见在舌背的后 2/3
B．牙舌中部丝状乳头增生呈毛状
C．有如波浪倒伏
D．用探针轻轻挑起
E．可见毛长 1mm 以上

533．沟纹舌临床常见类型
A．状如叶脉
B．状如结蒂
C．状如脑回纹
D．状如地图
E．状如菱形

534．正中菱形舌炎的临床特点
A．在人字沟的前方
B．有一块菱形
C．类似菱形的圆形或椭圆形的无乳头区
D．直径 1cm 左右
E．与周围组织有明显的界限

535．舌乳头炎包括

A．丝状乳头

B．菌状乳头

C．轮廓乳头

D．叶状乳头

E．各种乳头

536．舌痛症是主诉及的舌病痛感，但临床上特点是

A．常查不到阳性体征

B．组织病理亦无特征

C．舌的柔软度活动度均正常

D．除舌痛外，其它口腔粘膜也有烧灼样痛

E．能查到阳性体征

537．舌痛症多见于下列情况

A．鼻咽癌放射治疗后

B．全身情况（内分泌、性激素紊乱、维生素 B 族缺乏、更年期妇女）

C．由于各种原因，患者有咽部异物感，怀疑咽部有肿瘤产生恐惧心理，继而

感到舌部不适或疼痛

D．口内两种不同金属修复物，尤其内一侧，当上下牙合相对时产生微电流，

可有轻度疼痛

E．局部刺激（锐利的牙炎，不适合的托牙基板）

538．舌痛症患者往往有

A．集中精力于某一工作时，可暂时消失

B．可诉及舌部有烧灼样痛、钝痛或针刺样痛

C．对语言、饮食均无影响

D．有板机点

E．洗脸、刷牙、梳头皆可引起疼痛

539．舌痛症治疗

A．首先要排除舌部及口腔其他疾病引起的疼痛

B．消除患者恐惧心理，并应随访

C．必要时服各维素 100 毫克 3 次/日

D．0.5% 1.0%普通卡因液封闭

E．伴更年期症状的妇女，试用此佳激素治疗

540．梅毒是一种性传染性疾病主要是通过

A．性器官接触而得病即螺旋体通过皮肤粘膜的细微损伤侵入人体而发病

B．通过胎盘而累及

C．少数人可通过非性关系（如接吻、输血）感染
D．可借空气、昆虫、水食物而传染
E．唾液传播
541．后天梅毒下疳的临床表现
A．损害为蛋红至暗红色的圆形或椭圆形单溃疡
B．上覆棕黄色薄痂
C．无痛
D．指检时在溃汤底部角及知硬币或软骨样
E．疼痛剧烈
542．二期梅毒的皮肤损害称梅毒疹，其特点
A．状如斑疹者称玫瑰疹或蔷薇疹
B．为散在时称的无瘙痒的棕红色斑疹
C．界限不清，玻片压诊检查显褐色
D．状如丘疹者称丘疹型梅毒疹，除此较坚实外基本形态与玫瑰相似
E．有虹膜样红斑
543．梅毒瘤或树胶肿临床表现为
A．有弹性的肿块
B．中心坏死
C．可有被动感
D．然后溃破
E．导致软硬组织穿孔
544．舌部梅毒瘤的临床表现为
A．多数为弥散性间质性舌炎，故呈分叶状
B．伴有沟裂与舌乳头萎缩
C．且常在萎缩的边缘并发舌背白色角化病或白斑
D．伴地图舌
E．伴正中菱形舌
545．三期梅毒皮肤损害表现为
A．为结蒂型梅毒疹
B．病变呈扁平或碗豆大小的棕红色结蒂与溃疡
C．损害多见于面部、四肢、躯干等部位
D．有虹膜样红斑
E．尼氏征阳性
546．梅毒血清学检查常用
A．肢体结合反应（华氏试验）
B．絮状沉淀反应（康氏试验）

C．直接无疼荧光法

D．间接免疫荧光法

E．Tzanck 细胞学检查法

547．淋病的传染方式

A．主要为性交直接传染

B．如果接触病人的分泌物、衣服、便盆、浴巾等也可传染

C．通过胎盘累及胎儿

D．可借昆虫、空气传染

E．可通过围产期感染

548．淋病双球菌对皮肤粘膜感染情况

A．对未破损的皮肤不易感染

B．对未破损的粘膜可引起感染

C．对皮肤粘膜部不感染

D．只对淋巴结感染

E．通过血液感染

549．女性淋病临床表理

A．因女性尿道短，甚易蔓延至膀胱择约肌

B．因炎症刺激，排尿频度高，血尿也较多

C．尿道旁腺易受感染而发炎、肿胀、排脓并伴发外阴、阴道、宫颈、前庭大

腺等炎症

D．呈现白带多带脓血

E．宫颈口糜烂，腺体肿大、疼痛

550．淋菌性口炎多见于

A．新生儿自母体阴道传染

B．口性交

C．滥交史的患者

D．老年人

E．妇女

551．尖锐湿疣口腔内病损临床表现为

A．口腔病损累及舌、颊、唇、腭、牙龈等

B．表现为细小淡红色丘疹

C．表现为凹凸不平

D．易发生糜烂

E．触之即出血

552．尖锐湿疣一般临床表现为

A．病发时表现为淡红色小丘疹
B．逐渐增大，数目增多
C．逐渐融合，
D．若不及时治疗，迅速增大形成疣状
E．蒂形成后，表现为乳头状，蕈样或鸡冠

553．尖锐湿疣发生与下列哪些因素有关
A．与卫生习惯较差
B．局部潮湿不洁有关
C．抗体免疫功能特别是细胞免疫功能失调
D．免疫功能缺陷者如艾滋病，佰恶性淋巴瘤、慢性淋巴白血病患者发生率高
E．某些药物如免疫抑制剂和皮质类固醇的应用也可促进其发生

554．尖锐湿疣好发于
A．外阴（如男性的包皮内）
B．冠状沟
C．女性阴蒂、大小阴唇等部位
D．会阴、肛门
E．口周、趾间

555．尖锐湿疣治疗主要是局部冶疗
A．3%过氧化氢液消毒洗净
B．保持患部干燥
C．对疣体较大者可于局麻下手术切除
D．电凝固术
E．用青霉素治疗

556．艾滋病的特点是
A．患者的细胞免疫功能严重缺陷
B．失去对外界感染的抵抗能力
C．容易发生条件性感染
D．和少见的恶性肿瘤
E．最终死亡

557．艾滋病病毒 HIV 的特点
A．HIV 属于逆转 DNA 病毒，其形态为典型的 D 型病毒，是一种不耐高温的脆弱病毒，离开人体不易生存
B．在 50℃，30 分钟加热后，失去活力
C．一般消毒剂如 75%酒精，2.5%碘酊等均能使其消灭
D．耐寒，在-75℃冰冻状态下，可生存 3 个月

E．紫外线的杀灭作用不强

558．艾滋病传染途径

A．性接触感染

B．血液传播

C．胎儿和围产期感染

D．空气、水传播

E．昆虫、食物传播

559．艾滋病患病年龄

A．各年龄段均可

B．但以 20-49 岁者多见

C．儿童多见

D．老年人多见

E．中年妇女多见

560．艾滋病分几个期

A．HIV 感染期

B．艾滋病相关综合症期

C．艾滋病期

D．潜伏期

E．传染期

561．艾滋病 HIV 感染期特点

A．可完全没有症状

B．仅是带病毒者

C．化验检查 T4 细胞数正常

D．T4 细胞数目下降

E．在感染后 6 周血清 HIV 抗体检测为阳性

562．艾滋病条件性感染临床表现可分为几型

A．肺型

B．中枢神经系统型

C．胃肠型

D．原因不明发热型

E．呼吸道型

563．艾滋病具有特征性口腔表现

A．口腔念珠菌病

B．毛状口腔粘膜白斑

C．口腔疱疹

D．龈炎和龈口炎

E．颏麻木综合症

564．艾滋病毛状口腔粘膜白斑特点

A．主要在舌缘舌腹多为双侧性

B．表现为舌粘膜上皮增原而凸起的一片白色斑块

C．表面上有毛状突起

D．擦不掉

E．一般无自觉症状

565．艾滋病颏麻木综合症临床表现为

A．突发性发生单侧或双侧颏神经分布的麻木

B．无原因的全口牙痛

C．颊部感觉异常

D．整个面部感觉异常

E．常有板机点

566．艾滋病的预防要点

A．避免性关系紊乱

B．避免接触可能污染有 HIV 病毒的物品

C．对供血人员及血液制品严格选择

D．加强对危险人群的监境检疫，严防艾滋病传入

E．避免与外国人接触、交往

567．缺铁性贫血诊断从血象检查方面

A．贫血量低，血色素型小细胞型贫血

B．血红蛋白减少

C．血清含铁量减低，常低于 9.0μmol/L

D．大红细胞性贫血

E．主要是粒细胞减少

568．缺铁性贫血治疗

A．口服硫酸亚铁

B．复合维生素 B

C．高蛋白饮食

D．注意口腔卫生及口腔损害的对症治疗

E．口服叶酸、维生素B_{12}

569．普文氏综合症临床表现

A．吞咽困难

B．可出现皮肤痒、苍白、萎黄干燥

C．指甲扁平或是状反甲或脆甲

D．牙齿早脱现象等症状

E．慢性腹泻

570．巨幼红细胞性贫血的血象检查特点

A．骨髓检查可见有典型巨幼红细胞生成

B．周围血液检查呈大红细胞性贫血

C．低血包素型小细胞型贫血

D．粒细胞减少

E．血小板减少

571．再生障碍性贫血血象检查其特点

A．白细胞减少主要是粒细胞减少

B．血小板减少

C．出血时间延长

D．血块收缩不良等

E．低血色素型小细胞型贫血

572．再生障碍性贫血治疗

A．内科治疗可多次小量输入鲜血

B．抗生素防治感染

C．并且应用维生素 C、K 止血剂等

D．注意口腔卫生防治继发感染

E．口服硫酸亚铁

573．血液病人如果牙龈出血可采用哪些方法局部止血

A．牙周塞治剂

B．淀粉海棉

C．纱布压迫止血

D．肾上腺素棉球压迫

E．FN 烧灼

574．白血病口腔表现为

A．牙龈明显增生、肥大、水肿

B．由于白细胞浸润造成牙龈极度增生

C．增生高度可接近咬合面

D．而且外形不整齐

E．质地松软

575．对白血病患者进行口腔治疗时

A．必须十分谨慎

B．应避免不急需的外科处理

C．禁忌含有刺激或腐蚀性漱口剂和涂剂

D．要尽量避免在操作时引起出血和继发感染

E．口腔溃疡可用硝酸银烧灼

576．口炎是慢性和中娄的早期症状之一，因此口腔内有

A．金属味

B．唾液量多而粘稠

C．全口腔粘膜充血，牙龈水肿剥脱

D．继而出现牙槽骨萎缩

E．牙齿松动脱落，后期可发生骨坏死

577．黑斑的临床特点

A．常呈均匀一致的月状或小团块

B．边界清晰

C．不完全粘膜表面

D．无任何症状

E．全身健康良好，女性倍于男性

578．色素沉着——肠息肉综合症临床表现

A．显性遗传

B．口周粘膜皮肤包素斑

C．胃肠道息肉

D．吞咽困难

E．慢性牙周炎

579．经血循环引起的局部色素沉着，主要表现为龈缘部位带线，线状或颗粒状不同

色泽（从淡灰到蓝黑）的色素沉着分别称

A．铅线

B．铁线

C．小线

D．砂线

E．磷线

答案

A_1型题

1.B2.B3.E4.A5.D6.E7.D8.E9.E10E.11.E12B.13.A14.E15.D16.D17.E18.A19.D20.D21.B22.A23.A24.E25.E26.C27.E28.C29.C30.B31.B32.E33.C34.E35.D36.D37.D38.B39.D40.C41.E42.A43.E44.A45.A46.C47.D48.E49.B50.A51.A52.B53.D54.B55.A56.C57.B58.D59.A60.B61.A62.C63.E64.A65.B66.A67.A68.B69.B70.D71.E72.E73.E74.D75.A76.D77.E78.D79.C80.D81.C82.C83.A84.D85.D86.B87.B88.C89.E90.A91.D92.E93.D94.A95.C96.E97.C98.D99.B100.C101.E102.D103.C104.E105.A106.B107.E108.D109.A110.B111.A112.D113.A114.B115.B116.E117.C118.E119.D120.D121.A122.E123.A124.C125.D126.E127.A128.B129.C130.E131.B132.B

133.A134.D135.A136.E137.A138.B139.D140.C141.E142.B143.D144.A145.C146.A147.A148.D149.C150.E151.B152.D153.C154.E155.A156.B157.D158.E159.B160.E161.D162.A163.C164.B165.A166.B167.E168.D169.D170.B171.C172.C173.E3174.A175.A176.C177.E178.B179.C180.A181.D3182.D183.B184.E185.E186.C3187.A188.D

A_2型题

205.E206.D207.E208.B209.A210.D211.D212.B213.C214.C215.C216.E217.C218.C219.A220.B221.B222.E223.D224.B225.A

A3A4 型题

226.C227.C228.C229.C230.B231.D232.E233.E234.E235.A236.B237.C238.C239.D240.E241.E242.B243.B244.E245.D246.D247.B248.A249.E250.D251.B252.E253.D254.A255.C256.D257.D258.A259.B260.D261.E262.B263.E264.E265.C266.C267.A268.A269.A270.C271.A272.A273.C274.D275.D276.A277.B278.B279.B280.D281.C282.E283.A284.E285.C286.A287.B288.C289.B290.C291.E292.B293.D294.A295.D296.C297.A298.D299.A300.C301.A302.C303.B304.D305.D306.B307.E308.B309.C310.A311.D

B1 型题

312.A313.C314.B315.E316.E317.A318.D319.B320.A321.C322.D323.A324.B325.C326.E327.D328.A329.B330.B331.A332.D333.B334.A335.C336.C337.A338.B339.D340.E341.C342.A343.E344.D345.A346.B347.B348.C349.A350.D351.A352.C353.B354.D355.B356.A357.E358.C359.B360.C361.A362.A363.B364.C365.A366.B367.C368.B369.B370.C371.D372.E373.B374.C375.A376.A377.B378.C379.D380.A381.C382.B383.A384.B385.C386.E387.A388.C389.B390.D391.C392.A393.D394.E395.B396.C397.A398.B399.A400.B401.D402.C403.C404.E405.D406.C407.E408.A409.B410.E411.D412.C413.B414.A415.D416.B417.E418.C419.E420.C421.B422.C423.D424.A425.B426.D427.C428.E429.B430.C431.D432.A433.D434.E435.E436.A437.C438.D439.B440.E441.C442.B443.A444.D445.C446.E447.D448.C449.E450.B451.B452.A453.C454.D455.E456.A457.B458.A459.C460.B461.E462.B463.C464.D465.A466.C467.A468.E469.B

B_2型题

470.G471.C472.F473.E474.B475.D476.A477.I478.H